

samles under den opkastede Tang, der tilbyder dem overflødig Føde og ved sin Fugtighed beskytter dem mod Solstraalerne, hvis Virkning ellers for dem vilde være uundholdelig paa Sandet. Dette Forhold har meget beffæstiget mig og været et Middel til at berige vor Fauna med de skønneste og meest uventede Fund af Carabi, Staphylii, Dernestæ, Nitidulæ o. fl. Familier, hvorved den i flere Henseender har vundet en bestemt og tildeels overrassende sydlig Charakter.

Gjedses-Odde med det store Bots-Røret lader sig tildeels undersøge ved Hjælp af det samme Middel. Men denne Egn bliver overhovedet ved den gradvise Dvergang fra Flyvesandet paa Østkysten til Marsk bund ved Røret og tildeels høie Leerkliner over Havstokken paa Vestkysten til en af de mærkeligste af denne Art i Danmark. Jeg har der fundet samlede de fleste af de Arter, jeg kjender fra beslagtede Lokalteter paa Bornholm og i Nørre-Jylland og desuden forøget vor Fauna med et Par ubmærkede nye Sandbunds-Arter.

En tredje Egn, hvor Forholdene ligeledes paa en særegen Maade begunstige Indsamling efter en større Maalestok, ere de store Skovstrækninger i Lollands sydlige Hjørne. Freilevs-Skov, der i nogle Partier bestaaer af Lind (*Tilia parvifolia*), tilbyder i de derværende af Lindegrene flettede Hegn en bekvem Leilighed for Lindveds-Insekter, og jeg har der fundet saadanne i stor Mængde, der ellers overalt i Europa betragtes som store Sjeldenheder. Den store Roden-Skov tilbyder ligeledes ganske eiendommelige Forhold. Den bestod tidligere især af Ege, der nu for en stor Deel ere borthuggede og erstattede af en yppig Opvært af Avnbøg. I den nordlige Kant, hvor Bunden er tæt besaaet med Kullesteens-Blomme, er Skoven efterhaanden ganske borttagen og mellem de der endnu staaende Ege, Bøge, Elle og Avnbøgs-Stubbe og Stenene findes nu et lavt Krat af Hvidthjørn. Paa disse tørre, solaadne Steder, de saakaldte Steenvænger, samles, saalænge Thjørnene blomstre, store Skarer af de i Skovens gamle Ege og andre Skovtræer levende Insekter, og det samme er Tilfældet med de gamle Hvidthjørn, der findes spredte langs Randene af endeeel aadne Steder i den forøvrigt meget tætte Skov. Jeg har her gjort det skønneste Udbytte af sjeldne eller mærkelige og ikke saa nye Arter, især af Telephori, Elateres, Mordellæ, Malachii, Cerambyces, Anthribi, Tenthredines og Tipulæ.

Mange andre Lokalteter i Lolland-Falsters Stift, der have været Gjenstand for mine seneste Undersøgelser, lade sig ikke saa vel omhandle i Oversigt uden at opregne selve de fundne Arters Navne, hvilket jeg i nærværende Beretning har søgt at undgaae saameget som muligt. Imidlertid kan jeg nævne den af Salt gjennemtrukne Leerbund paa mange Steder ved Kysterne, saasom ved den sydlige Deel af Guldborg-Sund, i Rødby-Fjord og paa Nerne i Ralskov-Fjorden, Maalestokkene i Hannov, Hallerup og ved Pederstrup, de for Tyrretræerne særegne Svampe-Arter, den rige Flora af Vælleplanter og Engstrækningerne langsmed flere af Båndløbene som Lokalteter, der især have givet videnskabeligt Udbytte. Skovene i det nordvestlige Lolland have leveret nogle mærkværdige nye Insekter, der leve som Gjæster hos en Art Myre, *Formica fuliginosa*.

Det betydelige Standpunkt, Agerbruget indtager i den største Deel af Stiftet, den beredvillige Imødekommen af fordomsstri Anerkjendelse af videnskabelige Undersøgelser, man almindeligviis finder hos Landmændene, have ladet mig vinde mange nye Erfaringer angaaende Kornarternes og andre dyrkede Planter's Sygdomme. Foruden de tidligere Undersøgelser over Hvedemyggen og dens Gjænder har jeg tilveiebragt et anseeligt Materiale til Kundskab om flere Arter Blærefod (*Thrips*), *Bladlus*, *Snudebiller*, *Smaldere* og *Natsommerfugle*, som ville blive benyttede til den Række af Meddelelser for Landbrugere, hvis Udgivelse med det Første vil blive paabegyndt. Bygget, der i det Hele har været den meest angrebne Kornart i de sidste Aar, har nu faaet en ny Fjende i en Karab, *Zabrus gibbus*, der er optraadt masseris i adskillige Egne, især ved Ralskov. Dens Larve, der boer i Gange i Jorden, angriber den unge Plante, og det fuldkomne Insekt, der om Dagen holder sig skjult under Stene