

og Jordflumper, stiger om Natten op paa Straaet, hvor det fuldstændigt udæder Kornet. Imidlertid er dette Insekt ved sin Størrelse og sorte Farve saa iaineefaldende, at det uden stor Vanskelighed vilde kunne fjernes eller dog betydeligt indskrænkes ved hensigtsmæssig Indsamling af Billen. De Udelæggelser, der mere og mere foraarsages af Udenborrelarver, opfordre ligeledes stærkt til at lade Indsamlinger foretage af Billerne, hvortil jeg skal fremkomme med nærmere Forslag. En anden Fiende af forskellige Markfrugter begynder ligeledes at udbrede sig paa en truende Maade, nemlig Larven til en Art Smælde, *Agriotes lineatus*, i England velbekendt under Navn af Wire-worm. Paa Frisenfeldt paa Falster ovaad den i April d. A. 4 Ed. Land Hvede, saa at der maatte saaes paany. Ved Gjedsergaard og flere Steder paa Lolland har den gjort Skade paa Runkelrøer ved at afgnave de finere Rødder, og paa mange Bygmarker rundt om i hele Stiftet frembragte den sidst i Mai store syge Pletter ved at gnave paa Rødderne. — I Begyndelsen af Juli Maaned fik Bygmarkerne pludselig et foruroligende Udseende, idet Bladene, især det øverste, Aret omskedende Blad, i Løbet af saa Dage visnede, hvorved de grønne Marker fik gule Pletter og Striber. Denne Tilstand, der syntes truende, og om hvilken jeg har modtaget Meddelelse fra flere Egne rundt om i Danmark, bevirkes ved to Insekter, en Bladluus og en Art Blærefod, der opholdt sig paa Bladenes indvendige Flade. Da jeg ogsaa paa de grønne Planter fandt en Mængde spæd Vangel mellem Straaet og Bladene og især med at begnave og udsuge de sidste paa Indersiden, saa vidste jeg ikke, hvorvidt Staden vilde strække sig. Nu derimod, i de første Dage af August, er Straaet dog kun ubetydeligt angrebet og Arene slet ikke, saa at Skaden denne Gang kun er bleven umærkelig. At Grterne iaar ganske vel ere undgaaede Bladlusene, skyldes upaatvivelig den store Masse af Bladluusbiller og Bladluusparasiter, der især Efteraar bedækkede Markerne.

Den høje østlige Deel af Møen har jeg iaar for første Gang fundet Leilighed til at underkaste en omfattende entomologisk Undersøgelse, hvis Udbytte jeg har maattet finde meget tilfredsstillende. De Forhold, der her kunde ventes at medføre noget Eiendommeligt, staae meest i Forbindelse med Kridtets Optræden, og det er ogsaa dette, der meest har beskæftiget mig, deels i og ved Faldene i Klinterne ud mod Strandbredden, især hvor der findes Kildevæld, deels i det indre Høiland, hvor Kridtet træder frem til Overfladen, som paa Trylredandsbakkerne, paa Kongsbjerg og Herbleg. Faunen paa Klintekridtet er fattig, men høist særegen, og har leveret mig flere overraskende nye Fund, saasom nogle Staphyliner (*Stenus* og *Carpalimus*), en *Simplocarie*, en *Phryganeiform* og en *Lipularie* paa det af Kildevandet gjennemtrukne Kridt, der desuden har vist sig som et Vindlingsopholdssted for adskillige Arter, der ellers hos os forekomme paa fugtige Leerklinter, men her meget sparsomt, medens Klinten besidder dem i rig Fylde. Faunen paa de med Sand, Gruus og Leer blandede Kridtbjergene i det indre Høiland er langt rigere, og viser i sin Sammensætning en særegen; tildeels subalpinst Karakter; jeg fandt her flere mærkværdige, for vor Fauna nye Arter, tildeels i stort Antal, og adskillige Arter, der ellers forekomme sparsomt og vidt spredte i andre danske Egne, navnlig Vestjylland, Vesthyn og Nordsjællands Nordvestkyst, fandtes her samlede med de fornævnte i stort Antal. Et med Udenborrerne nærmest beslægtet Dyr, *Homaloplia ruralis*, hører til Høie-Møens meest fremtrædende Eiendommeligheder. At den forekom der, var mig bekendt fra en lille Samling af danske Insekter, der var anlagt og blev efterladt af forlangst afsøde Høiesterets-Advokat Rosenkilde, der ogsaa kan spores at have meddeelt enkelte Exemplarer af Billen til et Par ældre, nu tabte Samlinger til vor Fauna. Jeg havde forgiæves søgt den paa Klinten under et Par tidligere forte og flygtige Besøg, men nu lykkedes det mig at gjenfinde Rosenkildes Opdagelse, skjøndt først henvend hundrede Aar efter ham. Dens Levemaade er meget eiendommelig og nærmer sig endeel til hvad der er bekendt om nogle lignende Biller paa Sardinien og i Nordafrika. Den forekommer midt i Juni i Mængde mange Steder paa Klinten, men holder sig udelukkende til solaabne, mod Syd hel-