

ja steg endog til enkelte Tider til 27 à 50 pCt., og Grunden til denne Stigen af disse Sygdomstilfælde kan efter Stabslægens Mening alene søges deri, at Sygdommen i det Hele i denne Periode har været i Tiltagende blandt Hovedstadens Befolkning.

Hvad angaar Landet udenfor Kjøbenhavn foreligger der Beretninger fra Dyfsci for Aarene 1862—67, der imidlertid ikke udvise en saa afgjort Tiltagen af den veneriske Sygdom, som viser sig for Kjøbenhavns Bedkommende; Beretningerne udvise nemlig for 1862: 3,029 Sygdomstilfælde, for 1863: 2,850, for 1864: 2,720, for 1865: 3,385, for 1866: 3,249 og for 1867: 3,047. Men medens der saaledes ikke for dette Tidsrum kan paabises nogen Stigen i Antallet af Sygdomstilfælde, naar herunder medtages alle Former af de veneriske Sygdomme (Gonorrhoe, veneriske Saar, egentlig Syfilis), saa er Forholdet derimod et andet, naar der alene tages Hensyn til den konstitutionelle Syfilis; thi for denne Sygdoms Bedkommende alene udvise Beretningerne en meget stærk Tiltagen, nemlig fra 737 Tilfælde i 1862 til 1,167 i 1866 og 1,028 i 1867. Det samme Fænomen fremgaar ogsaa for Kjøbenhavns Bedkommende for samme Tidsrum, idet Antallet af Tilfælde af konstitutionel Syfilis steg fra 349 i 1862 til 869 i 1867.

Denne Tiltagen af den konstitutionelle Syfilis er efter Udvalgets Mening af overordentlig stor Betydning for den rette Bedømmelse af den foreliggende Sag, da denne Form for Sygdommen er den mest ødelæggende saavel for Individet som for Samfundet i det Hele, hvad der staar i nøie Forbindelse med den syfilittiske Sygdoms Giendommelighed i Almindelighed. Faren i saa Henseende ligger nemlig ikke deri, at det ingenlunde al Tid lykkes at helbrede et Syfilistilfælde, men deri, at det ofte er umuligt at afgjøre, om en Helbredelse er indtraadt eller ei. Sygdommen optræder nemlig meget ofte efter en tilshneladende Helbredelse paany; den kan saaledes vedvare i lang Tid, ja hele Livet igjennem, ytreunde sin Tilværelse ved forskellige Lidelser, der vel for en Tid lade sig dæmpe, men ikke fuldstændig bekæmpe, og som ofte

medføre en almindelig Svækkelse i Patientens Konstitution og gjøre ham ustkiftet til sin Gjerning, eller ved at angribe indvendige vigtige Organer, hvorved Patientens Liv enten sættes i øieblikkelig Livsfare eller Døden medføres efter foregaaende svære Lidelser, saasom udbredt Ramhed, Krampe, Sindssygdum (syfilittiske Hjernelidelser) o. s. v. Sygdommen har derhos vist sig at være arvelig, idet den overføres paa Patientens Børn, og Børn af syfilittiske Forældre komme derfor meget ofte døde til Verden, eller de dø af Sygdommen i deres spæde Alder, og, naar det lykkes dem at naa en længere Levealder, sfer det ofte med et nedbrudt Helbred for Livstid. En endnu større Fare for Samfundet medfører endelig denne Sygdom ved dens Overførelse til Andre; thi medens det er en Kjendsgjerning, at Syfilis kun opstaar ved Overførelse af Smitte fra et andet af Sygdommen lidende Individ, foregaar denne Overførelse ikke saaledes, at den angribes af Sygdommen, som selv forskyldte saadant ved at udsætte sig for Smitten; Overførelsen sfer tværtimod ofte til Ufskyldige, der aldeles ikke kunne vogte sig for Smitten, og — efter hvad ovenfor er anført om Banffeligheden ved Sygdommens Helbredelse — endog uden at den, som er Sygdommens Bærer, troer at kunne være Skyld deri. Patienter kan tro — og det ikke uden Grund —, at han er fuldstændig helbredet; han er derfor ikke opmærksom paa tilshneladende ubetydelige Affektioner, der senere vise sig, men som meget let kunne overføres til Andre ved direkte eller indirekte Berøring alene. Saaledes kan Sygdommen overføres, uden at Noget aner det, fra Ugtefælle til Ugtefælle, fra Forældre til Børn, fra et løsagtigt Dyende til hele Familien, fra Ammer til Pattedbørn og omvendt fra Børnene til Ammen, fra denne til hendes Mand og Børn, fra en Medlogerende til hans Kontubernal o. s. v. Denne Omstændighed, at det ikke med Sikkerhed kan stges, naar et Individ er fuldstændig helbredet for Syfilis, at han undertiden kan være i lang Tid tilshneladende rask, men derpaa kan faa Affektioner, som kunne smitte, eller at Sygdommen saaledes har latente Perioder, er en væsentlig Hindring for Ud