

Sommermaanederne Juni, Juli og August under vore Forsøg i Narene 1877 og 1878 og ligesaa iaar paa Rosenfeldt stadigt har givet størst Smørudbytte, traf vi her paa Rosvang alle-rede i Begyndelsen af August et andet Forhold paa Mælk fra jydste Røer (se nedenstaaende 2den—7de August). Bøtteprøverne gave ikke blot i Gjennemsnit, men i hvert enkelt Forsøg det største Smørudbytte. Røerne bleve derefter flyttede hen paa to ved Siden af hinanden beliggende Græsgange, Vandprøven forsøges af Forsøgsplanen, og der gjordes 6 Prøver daglig med Mælk af samme Maal, tre fra Angler- og tre fra jydste Røer (Række 25de—30te August); men det samme eiendommelige Forhold for de jydste Røer viste sig fremdeles og endnu stærkere udpræget. For nu at tilvejebringe saa ensartede Forhold som vel muligt lod Inspektør Vuus udfønde af de to Flokke 30 Røer af jydsk Race, 30 af Angler-Racen af gennemsnitlig ens Alder og ens Kølningstid, og de bragtes Side om Side i samme Græsgange (15 af hver Slags tværede i en Græsgang, og 15 slaede løse i en anden) (se Række 6te—13de September); da heller ikke her sporedes nogen Forandring, fik de jydste Røer en extra Tilgift af 2 Pd. Klid daglig pr. Ko (se Række 14de—21de September). Endelig gjordes fra 22de til 25de Sep-tember Forsøg med Mælk af Kvier.

Label I. Forholdstal for Smørudbytte af ens Mælkemængde.

	Angler-Røer (Kvier).			Jydste Røer (Kvier).		
	Is. 10 Lim.	Is. 34 Lim.	Bøtte 34 L. (22)	Is. 10 Lim.	Is. 34 Lim.	Bøtte 34 L.
Sommerforsøgene 1877 og 78 (Bøtte 22 L.)	95,0	100.	90,0
Rosvang 1879 (Bøtte 34 Limer).						
Røer 2.—7. August*.)	91,9	100.	98,5	88,2	100.	107,1
— 25.—30. — . . .	90,5	100.	101,6	86,5	100.	112,9
— 6.—13. Septbr..	92,7	100.	97,0	86,6	100.	111,1
— 14.—21. — .	92,4	100.	98,6	86,7	100.	111,1
Kvier 22.—25. — .	—	100.	106,4	—	100.	123,9

*) I denne Række er der 5 Forsøg med jydste, men kun eet Forsøg med Angler-Røer.

Label II. Forholdstal for Smørudbytte af al Mælken af samme Antal Røer.

	Is. 34 Limer.		Bøtte 34 Limer.		
	Angler.	Jydste.	Angler.	Jydste.	
Røer 18.—21. Septbr..	100.	83,7	100.	96,5	De „jydste Røer“ 2 Pd.
Kvier 22.—25. — .	100.	79,7	100.	89,4	Klid daglig.

Fra 18de September blev al Mælken fra hvert Sold Røer veiet og blandet i et Kar, før Prøverne udtoges, og vi have da Materiale til at beregne Label II. Mælken fra de jydste Røer maa altsaa ved alle disse Forsøg kaldes udpræget „tung“, det er: der er stor Forskjel mellem 10 og 34 Limers Skumning, og Bøttesystemet er i Overvægt; der raadebess ikke Dob paa denne Egenstaa ved Mælken, hverken ved Forandring af Græsgang eller ved Overgang til Klidfodring. Ved vore Forsøg i tidligere Aar have vi gjentagne Gange paavist „tung“ Mælk hen i Efteraaret, naar Røerne bleve gammelmalende; men her kommer den tunge Mælk paa