

eller de enkelte Køer, der i den nærmeste Tid maatte blive syge og frembyde Symptomer, som kunne lade formode Tilstedeværelse af den ondartede Lungesyge.

Derpaa skal jeg tillade mig at udbede mig det høie Ministeriums Resolution. Jeg skal dernæst drage Omsorg for, at de øvrige Køer, der ere komne fra Larsens Stalde, saa vidt det lader sig gjøre, udsøndres af de Besætninger, hvor de nu staa, og afsøndres paa en betryggende Maade.

Kjøbenhavn den 7de Marts 1881.

Bagge.

Til

Indenrigsministeriet.

### Bilag 32.

#### Obduktionsberetning.

Sektion den 9de Marts Form. Kl. 10 af 6 Køer, der paa Grund af smittefarligt Samkvem med Køer, der have lidt af Dagens ondartede Lungesyge, skulde nedslaaes ved offentlig Foranstaltning.

Nr. 1, en stor, hvidbroget Lødeko, 4 Aar gl., tilhørende Koholder Jensen, Vesterbrogade Nr. 147, opstaldet hos Mathiesen paa Hartmanns Plads.

Brysthinden var normal, og der fandtes ingen Ansamling i Brystrummet; Lungerne viste sig ved Besøling overalt luftfyldte og af sædvanlig Konsistens, med Undtagelse af begge de forreste Lungelapper og en Flig af venstre Lunges nederste Rand, der var fast og haard at føle paa og af en dyb, rød Farve, og var skarpt begrænset mod det øvrige Lungevæv; ved Indsnit i disse Partier fandtes de aldeles lufttomme og af et kjødagtigt, granuleret Udseende (gamle Peribronkitides). Et enkelt Sted i Randen af disse fortættede Partier fandtes det interlobulære Bindevæv fast og hypertrofiert, men denne Fortykkelse var tydeligt af gammelt Datum og havde naaenlig Intet tilfælles med Forandringerne i den ondartede Lungesyge.

Nr. 2, en lille, rød Lødeko, 6 Aar gl., tilhørende Kreaturkommissionær Larsen, Vesterbrogade Nr. 35.

Brysthinden var normal; og der fandtes ingen Ansamling i Brystrummet; Lungerne fandtes ved Besøling overalt af normal Konsistens. Ved Indsnit fandtes, navnlig i venstre Lunges øverste Rand, i det interstitielle Væv en halvflydende, gelatinøs, gullig Masse, og Brysthinden var paa de tilsvarende Steder af et gulligt, misfarvet Udseende, navnlig langs Lymfekarrenes Forløb, men den var ikke her fortykket og heller ikke belagt med Eksudat. I den høire Lunge fandtes ingen tilsvarende Forandring, idet Snitfladen her overalt var af et normalt Udseende. Forøvrigt var selve Lungenvævet ogsaa i venstre Lunge overalt af et fuldstændig sundt Udseende.

Dette Sektionsfund tyder paa en begyndende interstitiel Liden, saaledes som den er karakteristisk for den ondartede Lungesyge; paa Grund af det overordentlig lidt udviklede Eggdomsbillede, kan Diagnosen dog ikke stilles som konstateret.

Nr. 3, en mellemstor, rød Lødeko, 7 Aar gl.,

Nr. 4, en mellemstor, rødbragete Lødeko, 6 Aar gl.,

Nr. 5, en mellemstor, rød Lødeko, c. 10 Aar gl.,

Nr. 6, en stor, hvid, blaaktænket Lødeko, 5 Aar gl.,

tilhørende samme Eier, viste ved Sektionen ingensomhelst sygelige Forandringer i Brystorganerne.

Kjøbenhavn, den 9de Marts 1881.

A. Jacobsen,  
Docent.

Til Politidirektøren i Kjøbenhavn.