

Bilag III.**Udskrift af Marsberetning for Bøgense Lægedistrikt for Aaret 1887.**

— — — Af ovenstaaende Skema fremgaar, at Antallet af Sygdomstilfælde i de 2 sidste Aar har været langt betydeligere end i de foregaaende Aar. Dette har navnlig sin Grund i, at der i begge Aarene har været Epidemier af tyfoid Feber udbaaende fra et Meieri. I 1886 var Dre Andelsmeieri Udgangspunktet for Smitteens Udbredelse til Omegnen og i 1887 var det Uggerslev Fællesmeieri. Ligesom Epidemien i 1886 (med 109 Patienter) blev Epidemien i 1887 (med 42 Patienter) tagen under offentlig Behandling; 5 af Patienterne bleve behandlere paa Sygehuset i Odense, 6 paa Sygehuset i Bøgense og Resten (31) i de respektive Hjem. Hele Epidemien varede fra 20de Juni til 4de September, da den sidste Patient kom under offentlig Behandling, ca. i 77 Dage, medens den offentlige Behandling først traadte i Kraft den 17de Juli og vedvarede til 21de September, da den sidste Patient blev udfreven af Sygehuset i Odense, ca. i 67 Dage. Epidemien havde i det Hele taget en mild Karakter. Feberen var af Middelsstyrke, ingen alvorlige Komplikationer, derfor intet Dødsfald under hele Epidemien. Med Hensyn til Meieriets Forhold til Epidemien, dennes Opstaaen, Forløb, samt de Forholdsregler, der af Autoriteterne bleve tagne for at forhindre Epidemiens videre Udbredelse, skal jeg tillade mig at henvise til den af mig den 5te November 1887 til Hystikatet givne Indberetning — — — — —

En mindre, lokal lille Epidemi af Febr. typhoid. (8 Tilfælde, fordelte paa 3 Huse) opstod i de første Dage af September i Tørresø. Den opstod pludselig, syntes at staa i Forhold til et herbærende Meieri, hvor der herskede den største Uorden og Urenlighed. Dette Meieri blev nedlagt i Slutningen af August, og dette er maasse Grunden til, at nævnte Epidemi ikke udbredte sig videre, men nøiedes med de 8 pludselig og samtidig opstaaende Tilfælde. Ingen af de 8 Angrebne døde. De øvrige 61 Tilfælde af gastrisk og tyfoid Feber i Landsognene i 1887 fandtes spredte ud over hele Distriktet, i størst Mængde i de samme Maaneder, hvori Epidemien optraadte; men medens, som anført, Epidemierne havde en mild Karakter, vare disse spredte Tilfælde gennemgaaende meget heftige. I en Gaard i Gilstov blev Konen, Sønnen og en Tjenestpige angrebne. Konen og Tjenestpigen døde, og Sønnen laa i en meget lang Tid, førend han blev rask. Paa et Par Meierier har der været Tilfælde af tyfoid Feber. Disse ere strax blevne flyttede til et Sygehus og Lokalerne rensede og desinficerede for at forebygge Smitteens Udbredelse med Mælken; thi at navnlig for den tyfoide Febers Vedkommende Smitteudbredelsen ofte sker paa denne Maade, fremgaar tydeligt af den omtalte Epidemi i 1886, ligesom ogsaa af den i 1887 omtalte. I det Hele taget er Hyppigheden af tyfoid Feber tiltagen i de sidste 2 Aar, hvilket rimeligvis hænger sammen med Oprettelsen af flere og flere Meierier, saa at nu næsten alle Producenter bringe deres Mælk til Meierierne. Enkelte Steder her i Distriktet, hvor det endnu ikke er Regel at sælge Mælk til et Meieri, synes ogsaa at have været mere skaanet for Febr. typhoid.