

Beregnes Sygeligheden paa 10,000 Individuer af den saaledes bestemte Følkemængde, faas følgende totale Kvotienter:

	Gonorrhoe.	Venerisk Saar.	Syfilis.	Tilsammen.
1864—75.....	300	108	113	521
1876—87.....	395	89	94	578

Det ses, at Kvotienten for samtlige veneriske Sygdomme viser en Tilvæxt for den sidste Periode, hvilken alene skyldes Gonorrhoe, medens de to andre Former vise en Nedgang. Den Omstændighed, at Forholdet mellem Følketalene i Kjøbenhavn og det øvrige Danmark ikke holder sig paa samme Punkt, gjør det nødvendigt at undersøge hver af disse Lokaltreter for sig; uagtet man ved at sammenfatte dem under eet opnaar at ophæve den Feiltilde, som bestaar i, at en vis Mængde Tilfælde af veneriske Sygdomme gaa fra Provindserne til de kjøbenhavnske Specialisters Behandling og det i stigende Grad, eftersom Udviklingen af Trafiken om Kjøbenhavn som Centrum tiltager, saaledes at der derved bevirkes en kunstig Ophobning af Tilfælde i Kjøbenhavn og en tilsvarende nominal Aftagen af Sygetallene for Provindserne. Det er umuligt at bestemme Omfanget af denne Feiltilde, da der ikke vides det Mindste om Antallet af saadanne Tilfælde, som opstaaede i Provindserne figurere paa de kjøbenhavnske Lægers Lister. Antager man denne Feiltilde for at være saa stor, at den umuliggjør en særskilt Undersøgelse for hver af de to Lokaltreter, og lægger man de fremsførte Tal til Grund for et Skjøn om de veneriske Sygdommes Forekomst i de to Perioder, vil det være en uafviselig Fordring at tage Hensyn til 1) de alt nævnte Momenter (lettere Afgang til Lægehjælp osv.) som bevirke en ikke til de virkelige Forhold svarende Forøgelse af Sygetallene i den sidste Periode, 2) de Mangler ved den kjøbenhavnske Sygelighedsstatistik, som ville blive paaviste i det følgende, og som foraarsage, at Sygetallene i den første Periode i alt Fald for Syfilis Bedkommende blive for lave 3) den store Indflydelse paa Tallene for Gonorrhoe, som skriver sig fra den paa Side 12—13 omtalte sforandrede Opsattelse af Begrebet Gonorrhoe i Kjøbenhavn, hvorved i det sidste Tidsrum en Mængde Sygdomstilfælde, hvis specifikke, infektiøse Natur er stærk Tvivl underkastet, inddrages under Statistiken. Der gives andre Omstændigheder (den Forudsætning, at Forholdet mellem første Udbrud og Recidiver holder sig uforandret i begge Tidsrum, at der ikke er foregaaet væsentlige Forskydninger mellem Tallene i de forskjellige Aldersklasser i den levende Befolkning o. fl. a.) hvis Betydning vi aldeles savne Midler til at bedømme og som vi derfor ere nødte til ganske at overse, men vil man paa Grundlag af alt det Fremførte vove sig til et Skjøn om Udbredelsen af veneriske Sygdomme i de to Tidsrum i hele Landet, kan der ikke gives andet end dette:

At Forekomsten af veneriske Sygdomme, i alt Fald venerisk Saar og Syfilis, er noget, maaske meget sjældnere i Tidsrummet efter 1875 end i det foregaaende Tidsrum.

Man skjønner imidlertid, at der vindes Mere end der tabes i Nøagtighed ved at undersøge Kjøbenhavn og Danmark udenfor Kjøbenhavn hver for sig.