

Hvad angaar venerisk Saar og Syfilis, vil det af Grunde, som tidligere ere fremførte, næppe være tilladeligt at undersøge hver af disse Former for sig. Til disse Grunde kommer en anden, særlig for Kjøbenhavn: Praxis paa det Hospital i Kjøbenhavn, som hovedsagelig modtager veneriske Syge til Behandling, har efter de derom indhentede Oplysninger været ikke at forrigrere Anmeldelserne af saadanne Affektioner, som ved Indlægelsen diagnosticeredes og anmeldtes som veneriske Saar, men efter nogen Tids Forløb viste sig at være syfilitiske.

Slaar man Tallene for begge disse Former sammen, finder man som anført paa Tab. IV. Sygelighedskvotienterne at være 1864—75 1,269, 1876—87 1,153. Under den Forudsætning, at Begrebet, venerisk Saar, har samme diagnostiske Omfang i begge Tidsrum, og under Hensyntagen til forskellige Mængder ved Materialet, som ere anthydede i det foregaaende, synes man berettiget til at sjonne:

At venerisk Saar og Syfilis relativt (i Forhold til Folkemængden) optræde med noget mindre Hyppighed i Tidsrummet 1876—87 end i Tidsrummet 1864—75.

Det er indlysende, at hvis man for et længere Tidsrum besad aarlige Opgivelser af Antallet af første Udbrud af Syfilis hos Individuer, boende i Kjøbenhavn og smittede der, med Angivelse af Alder, Kjøn og Stand, vilde der kunne tilveiebringes Tal af ganske anden Bægt end de ovenfor anførte, men et saadant Materiale kan ikke staffles til Veie.

Tab. V.

## Veneriske Sygdomme paa Kommunehospitalet i Kjøbenhavn.

	Mænd med 1ste Udbrud af Syfilis.	Kvinder med 1ste Udbrud af Syfilis.	Samtlige veneriske Patienter.
1864 .....	179	138	1,071
1865 .....	190	167	1,036
1866 .....	232	173	1,274
1867 .....	191	147	1,189
1868 .....	250	172	1,603
1869 .....	266	175	1,731
1870 .....	263	192	1,605
1871 .....	252	195	1,270
1872 .....	212	149	1,563
1873 .....	164	109	1,463
1874 .....	223	123	1,605
1875 .....	205	157	1,312
1864—75 .....	2,627	1,897	16,722