

Syphilis hos fødende Kvinder paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn.

Tab. VI.

	Fødende Kvinder.	Af de fødende Kvinder led af manifest Syphilis eller fødte syfilitiske Børn.
$\frac{1}{4}$ 65 — $\frac{31}{8}$ 66	1,182	22
" 70 — " 71	1,055	11
" 71 — " 72	1,066	19
" 72 — " 73	1,014	10
" 73 — " 74	1,115	7
" 74 — " 75	973	14
$\frac{1}{4}$ 65 — $\frac{31}{8}$ 66 og $\frac{1}{4}$ 70 — $\frac{31}{8}$ 75	6,405	83
$\frac{1}{4}$ 75 — $\frac{31}{8}$ 76	943	18
" 76 — " 77	1,004	12
" 77 — " 78	1,003	8
" 78 — " 79	1,063	8
" 79 — " 80	1,173	3
" 80 — " 81	1,140	13
" 81 — " 82	1,277	10
" 82 — " 83	1,385	7
" 83 — " 84	1,304	15
" 84 — " 85	1,424	8
" 85 — " 86	1,529	13
" 86 — " 87	1,141	8
$\frac{1}{4}$ 75 — $\frac{31}{8}$ 87	14,386	123

Årsberetningerne for Tidrummet 1866—70 indeholde ikke Oplysninger om Syphilis hos fødende Kvinder.

Tages den gennemsnitlige Sygelighedskvotient for samtlige Åar tilfammen og beregnes, hvor mange Tilfælde af Syphilis man kunde have ventet i hvert Tidrum, faas i 1ste Tidrum 63, i 2det 143, medens der forefandtes henholdsvis i 1ste Tidrum 83, — 123.

Erferingerne fra Fødselsstiftelsen tyde paa en mindre Udbredelse af Syphilis i Tidrummet efter 1875 end i Tidrummet før 1875.