

Bestand af ældre Østers, og Banken vil næppe i de første Aar komme til Kræfter, da der synes at være meget lidt Angel.

Venø Bugt. Udfor Lune og Hærup fandtes særdeles god Opvæxt af 2- og 3-aarig Angel. Haastrup Banken og Lokalteten udfor Nygaard's Hage ere i god Stand og rigt besatte med Angel fra 1—3 Aar. Udfor Eising findes Intet. Sandbjerg- og Holstrup Banken er meget lovende, der findes fortrinlig Angel-Opvæxt, især 2- og 3-aarig.

Ved Brald ligeledes megen Angel. Østen Venø: Paa de sydligste Lokaliteter findes ret god Bestand af vogne Østers med rigelig Angel, især 1- og 2-aarig. Nordligere (S. f. Klov Vig) ligeledes god Opvæxt med 3-aarig. Vesten Venø: Fra Nordkysten til Rønkjær Odde god Bestand af 2-—3-aarige Ungøsters. Ved Sønerflovkrog ligeledes. Hele Strækningen fra Sandbjerggaard til Grisetaa Odde (Odde Sund) fandtes godt besat med 2-aarig Angel (næsten gjennemgaaende fastsiddende paa Buccinum undatum). Strækningen N. f. Loubjerg Odde og Bugten S. f. denne lykkes det os ikke at faae undersøgt tilstrækkeligt, dels paa Grund af Nedgarn, dels fordi vi af Storm bleve drevne derfra. Da begge Lokaliteter ere uden Betydning, fandt jeg det ikke værdt at ofre længere Tid derpaa.

Undersøgelserne paa den lille Blet ved Indløbet til Skibsted Fjord førte heller ikke til noget Resultat, idet Storm og lav Vandstand tvang os til at forlade Stedet efter et Par frugtesløse Forsøg paa at skrabe med Travl.

Ved Futterup fik vi kun Døbtang; der findes vistnok saa godt som ingen Østers. Derimod var der fuldt op af Angel paa Meilgrunden ved Orndrup Hage, i Tæbring Vig og ved Skhum Hage, især 2- og 3-aarig, desuden syntes der at være god Bestand af 4-Aars Østers.

I Vil Sund findes langs Mors en Del vogne Østers med god Opvæxt af 3-aarig og tildeels 2-aarig Angel.

Thisted Bredning: Udfor Gulderup og ved Trange Hage er Tilstanden meget lovende; der findes mange vogne Østers og — navnlig ved Trange Hage — rigelig Angel i en Alder af 2—3 Aar.

Paa Stjærhø Banken og Skarre Hage traf vi udmærket Bestand med særdeles megen Angel fra 1—3 Aar. Paa Blødebanken udfor Sennels fandtes megen Døbtang, men desuagtet beholdt vi adskillige Østers, blandt hvilke en Del 2-—3-aarig Angel. Udfor Taartoft og S. f. Thisted Havn traf vi en god Bestand af vogne Østers og rigelig Opvæxt af 3-aarig Angel. Ved Silstrup og paa Holmen findes for Tiden saa godt som ingen vogne Østers. Et Par yngre Individuer udgjorde hele Udbyttet af vore Skrabninger.

Rissum Bredning. Humlum Bankerne ere godt besatte med 1- og 3-aarig Angel. Udfor Rimmene beholdtes Intet med Undtagelse af en enkelt Ungøsters, men Windstille og Tang hindrede Skrabningen. Ved Rissum Odde fandtes en ret anseelig Bestand af 2- og 3-aarig Angel; de ældre vare i en meget slet Forfatning, magre, vandede og med Skaller, som vare stærkt medtagne af den børende Clione-Svamp. S. f. Rønne traf vi kun sparsom Angel fra forrige Sommer, ingen vogne. Øst og Vest for Rønne beholdtes kun en ringe Mængde 3-aarig Angel, og paa det udstrakte Terrain Nord for Rønne fandtes kun sparsom Angel fra de to sidste Aar. Men sandsynligvis hidrører det mindre gode Udfald af vore Skrabninger og andre Undersøgelser paa disse Lokaliteter fra den Omstændighed, at Bunden var stærkt overfyldt med levende Tang („Parrykker“), der dog ikke udøver nogen skadelig Indflydelse paa Østerferne. Ved Geller Odde var der pletvis ret godt med 2-aarig Angel. Fra Hilligsø langs Nordøstkysten af Bredningen fandtes der overalt paa Bankerne rigelig Angel fra 1 til 3 Aar.

Endnu skal jeg kun tilføie, at jeg, efter at have affsluttet min egentlige Undersøgelse, paa Tilbagevejen stoppede D. f. Løgstor for at efterse de gamle Lokaliteter ved Sønderlo og udfor Marbjerg Tunge, men at det hverken det ene eller det andet Sted lykkes mig at træffe en eneste Østers.

Det vil af foranstaaende Meddelelse fremgaa, at Fredningen, der nu har været i 3 Aar, har haft en overordentlig gavnlig Indflydelse paa Bankernes Tilstand. Men at høre Fredningen nu vilde være det Samme som at ødelægge Udsigterne for det fremtidige Østersfiskeri. Det skal indrømmes, at paa adskillige Lokaliteter er en Del af den under Fredningsperioden fremkomne Angel allerede saa vidt fremstreden, at den om et Aars Tid