

Tab. I.

Dødsfald af medfødt Syfilis i Aldersklassen 0—1 Aar i Kjøbenhavn.										Antal af levende fødte Børn i Kjøbenhavn.	
1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1868—77	1868—77
13	11	13	15	5	22	20	30	38	34	201	62,994
1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1878—87	1878—87
33	31	22	23	33	32	39	38	33	43	327	97,169

Tager man Gjennemsnitsdødeligheden for begge Tidrum tilfammen og beregner, hvor stort et Antal Dødsfald man i Forhold til Antallet af levende fødte Børn kunde have ventet i hvert Tidrum, faar man som Resultat:

1868—77 døde af medfødt Syfilis 201; der kunde ventes 207
 1878—87 — — — 327; — — 321

Denne Beregning viser begge Tidrum ligestillede. Forudsætningen for at disse Tal kunne opfattes som paalidelige Udtryk for de virkelige Forhold, er imidlertid den, at Diagnosen „medfødt Syfilis“ (eller „venerisk Sygdom“) er anvendt af Lægerne i samme Omfang i begge Tidrum, men denne Forudsætning kan med Sikkerhed siges ikke at være til Stede. Naar saaledes Kommunehospitalets Aarsberetning for 1866 melder, at der paa dette Hospital i det nævnte Aar er indtruffet 8 Dødsfald af medfødt Syfilis, medens Mortalitetstabellen for hele Staden for samme Aar kun har 9 Dødsfald, naar Aaret 1869 endog har Tallet 13 for Kommunehospitalet og kun 11 for hele Staden, tør man heraf slutte, at der i disse Aar udenfor Hospitalet er indtruffet mange Dødsfald af medfødt Syfilis, som af vedkommende Læger ere henførte under andre Diagnoser. Dette Forhold har forandret sig i Tidens Løb. I 1884—87 have Lægerne udenfor Hospitalet dobbelt saa mange Dødsfald af medfødt Syfilis som Hospitalet, i 1864—69 have de omtrent samme Antal som Hospitalet. Man vil herefter være berettiget til at antage, at Diagnosen „medfødt Syfilis“ (venerisk Sygdom) i første Tidrum er anvendt i et mindre Omfang end i det sidste Tidrum, og at Resultatet af Tab. I. maa tydes som større Dødelighed efter medfødt Syfilis i Tidrummet 1868—77 end i Tidrummet 1878—87.

Om man kan overføre dette Resultat paa Forekomsten af selve Sygdommen, afhænger af om Sygdommens Intensitet (Forholdet mellem syge og døde) er den samme i begge Tidrum; derom vides imidlertid intet, og tilfredsstillende Oplysninger derom ville næppe nogenstunde kunne staffles til Veie.

II. Sygelighedsstatistikken.

Denne lider af den Mangel, at den paavirkes af Afdgangen til Lægehjælp og Befolkningens Tilbøielighed og pekuniære Evne til at søge Lægehjælp. Alt Andet lige, ville alene disse Momenter give Sygetallene for Perioden efter 1875 en Overvægt, som altsaa kun er tilsyneladende.