

Beregnes Sygeligheden paa 10,000 Individuer af den saaledes bestemte Folkemængde, faas følgende totale Kvotienter:

	Gonorrhoe.	Veneriff Saar.	Syfilis.	Tilsammen.
1864—75.....	300	108	113	521
1876—87.....	395	89	94	578

Det ses, at Kvotienten for samtlige veneriske Sygdomme viser en Tilvæxt for den sidste Periode, hvilken alene fyldes Gonorrhoe, medens de to andre Former vise en Nedgang. Den Omstændighed, at Forholdet mellem Folketallene i Kjøbenhavn og det øvrige Danmark ikke holder sig paa samme Punkt, gjør det nødvendigt at undersøge hver af disse Lokaltiteter for sig, naagt man ved at sammensfatte dem under eet opnaar at ophæve den Feiltilde, som bestaar i, at en vis Mængde Tilfælde af veneriske Sygdomme gaa fra Provindserne til de kjøbenhavnske Specialisters Behandling og det i stigende Grad, efter som Udviklingen af Trafiken om Kjøbenhavn som Centrum tiltager, saaledes at der derved bevirkes en kunstig Ophobning af Tilfælde i Kjøbenhavn og en tilsvarende nominal Afstagen af Sygetallene for Provindserne. Det er umuligt at bestemme Omfanget af denne Feiltilde, da der ikke vides det Mindste om Antallet af saadanne Tilfælde, som opstaaede i Provindserne figurere paa de kjøbenhavnske Lægers Lister. Antager man denne Feiltilde for at være saa stor, at den umuliggjør en særskilt Undersøgelse for hver af de to Lokaltiteter, og lægger man de fremsførte Tal til Grund for et Skjøn om de veneriske Sygdommes Forekomst i de to Perioder, vil det være en naafviselig Fordring at tage Hensyn til 1) de alt nævnte Momenter (lettere Udgang til Lægehjælp osv.) som bevirke en ikke til de virkelige Forhold svarende Forøgelse af Sygetallene i den sidste Periode, 2) de Mangler ved den kjøbenhavnske Sygelighedsstatistik, som ville blive paaviste i det følgende, og som foraarsage, at Sygetallene i den første Periode i alt Fald for Syfilis Bedkommende blive for lave 3) den store Indflydelse paa Tallene for Gonorrhoe, som skriver sig fra den paa Side 12—13 omtalte forandrede Opfattelse af Begrebet Gonorrhoe i Kjøbenhavn, hvorved i det sidste Tidrum en Mængde Sygdomstilfælde, hvis specifikke, infektiøse Natur er stærk Tvivl underkastet, indrages under Statistiken. Der gives andre Omstændigheder (den Forudsætning, at Forholdet mellem første Udbrud og Recidiver holder sig uforandret i begge Tidrum, at der ikke er foregaaet væsentlige Forstyrrelser mellem Tallene i de forskjellige Aldersklasser i den levende Befolkning o. fl. a.) hvis Betydning vi aldeles savne Midler til at bedømme og som vi derfor ere nødte til ganske at overse, men vil man paa Grundlag af alt det Fremførte vove sig til et Skjøn om Udbredelsen af veneriske Sygdomme i de to Tidrum i hele Landet, kan der ikke gives andet end dette:

At Forekomsten af veneriske Sygdomme, i alt Fald veneriff Saar og Syfilis, er noget, maaske meget sjældnere i Tidrummet efter 1875 end i det foregaaende Tidrum.

Man skjønner imidlertid, at der vindes Mere end der tabes i Nøagtighed ved at undersøge Kjøbenhavn og Danmark udenfor Kjøbenhavn hver for sig.