

Som Grundlag for Beregningen af Sygelighedskvotienterne er benyttet Folketallene den $\frac{1}{2}$ 1870 og den $\frac{1}{2}$ 1882, hvilke vise sig at falde sammen paa det Nærmeste med den aarlige Gjennemsnitsbefolkning i hvert af de to Tidsrum.

Efter Tab. IV. at dømme vise venerisk Saar og Syfilis tilsammen en noget mindre, Gonorrhoe en meget større Udbredelse i det sidste end i det første Tidsrum. Efter de Oplysninger angaaende Bestaffenheden af det til Grund for Tabellen liggende statistiske Materiale, som skulle fremsættes i det følgende, vil det være klart, at de fremførte Sygelighedskvotienter kun ere høist usuldkomne Udtryk for de virkelige Forhold.

Man skal da minde om de store Vanskeligheder, der ere forbundne med Udviklingen af en nogenlunde paalidelig Sygelighedsstatistik i en Storstad. Opstaaet i Slutningen af 50'erne ad Frivillighedens Vej og ved de kjøbenhavnske Lægers egen Impuls har den kjøbenhavnske Sygelighedsstatistik maattet arbejde sig frem gennem mange Hindringer, dels saadanne, som skyldes Læger, der negte at udfylde deres Sygelister eller udfylde dem paa en skjodesløs Maade, dels saadanne, der skrive sig fra Samarbejdet mellem Hospitalslægerne og Lægerne udenfor Hospitalerne, dels saadanne, der skyldes Materialet, in casu de veneriske Sygdomstilfælde. Det maa antages, at disse Mangler have langt større Betydning for det første end for det andet Tidsrum. Saaledes kan anføres, at i Maret 1862 er der ikke indsendt Sygelister fra Alm. Hospital, hvad der fremgaar af en Bemærkning paa den skematiske Sygeliste for Staden Kjøbenhavn i 1862, trykt i Sundhedskollegiets Forhandlinger for Maret 1863: Naar Listerne fra dette Hospital, der i en lang Arrække optog et stort Antal Veneriske, ere begyndte at indgaa, kan ikke ses af de trykte Beretninger. Ogsaa den Blads, der er anvist de veneriske Sygdomme paa de i „Ugeskrift for Læger“ indtil 1876 trykte ugentlige Beretninger om epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn, antyder, at man kun har tillagt de opgivne Tal ringe Betydning.

Hvor store Mangler der klæbe ved den kjøbenhavnske Statistik over veneriske Sygdomme, fremgaa dog bedst af følgende Undersøgelse:

Gjennemgaa man Aarsberetningerne fra Kommunehospitalet, Alm. Hospitals 2den Afdeling og Garnisonskøgehuset for Aarene 1875 og 76, faas for begge Aar tilsammen følgende Antal behandlede

Gonorrhoe	Venerisk Saar	Syfilis.
2,149	414	1,390

medens Antallet af anmeldte fra hele Staden (inklusive Hospitalerne) er

7,178	1,991	1,386
-------	-------	-------

For Aarene 1886 og 1887 tilsammen faas

	Gonorrhoe.	Venerisk Saar.	Syfilis.
Behandlede paa de nævnte 3 Hospitaler (Vestre Hospital = Alm. Hosp. 2. Afdeling) }	4,332	500	2,048
Anmeldte fra hele Staden (inklusive Hospitalerne) }	11,229	2,524	3,858

Der er altsaa i 1886—87 fra hele Staden anmeldt henimod dobbelt saamange Tilfælde af Syfilis, som der er behandlet paa Hospitalerne, hvad der synes naturligt, da Begrebet Syfilis paa Sygelisterne ogsaa omfatter de kroniske Tilfælde, der kunne behandles og blive behandlede ambulatorisk eller i Hjemmet.

I Aarene 1875—76 er der derimod behandlet flere Tilfælde af Syfilis paa Hospitalerne, end der er anmeldt fra hele Staden (inklusive Hospitalerne). Det synes utvivlsomt, at der her i disse Aar er begaaet store Feil enten paa de anmeldende Lægers Side eller under Materialets Bearbejdelse paa Stadslægekantoret eller paa andre Punkter, og naar der i disse Aar er behandlet alene paa Hospitaler 1,390 Tilfælde af Syfilis, maa det for hele Staden angivne Antal, 1,386, være meget for lavt. Ogsaa for en Arrække før 1875 kan man godtgjøre Tilstedeværelsen af et lignende Misforhold mellem Tallene