

Hvad angaar venerisk Saar og Syphilis, vil det af Grunde, som tidligere ere fremførte, næppe være tilladeligt at undersøge hver af disse Former for sig. Til disse Grunde kommer en anden, særlig for Kjøbenhavn: Praxis paa det Hospital i Kjøbenhavn, som hovedsagelig modtager veneriske Syge til Behandling, har efter de derom indhentedede Oplysninger været ikke at forrige Anmeldelserne af saadanne Affektioner, som ved Indlægelsen diagnosticeredes og anmeldtes som veneriske Saar, men efter nogen Tids Forløb viste sig at være syfilitiske.

Slar man Tallene for begge disse Former sammen, finder man som anført paa Tab. IV. Sygelighedskvotienterne at være 1864—75 1,269, 1876—87 1,153. Under den Forudsætning, at Begrebet, venerisk Saar, har samme diagnostiske Omfang i begge Tidrum, og under Hensyntagen til forskellige Mangler ved Materialet, som ere antydede i det foregaaende, synes man berettiget til at sjonne:

At venerisk Saar og Syphilis relativt (i Forhold til Folkemængden) optræde med noget mindre Hyppighed i Tidrummet 1876—87 end i Tidrummet 1864—75.

Det er indlysende, at hvis man for et længere Tidrum besad aarlige Opgivelser af Antallet af første Udbrud af Syphilis hos Individuer, boende i Kjøbenhavn og smittede der, med Angivelse af Alder, Køn og Stand, vilde der kunne tilveiebringes Tal af ganske anden Bægt end de ovenfor anførte, men et saadant Materiale kan ikke staves til Veie.

Tab. V.

Veneriske Sygdomme paa Kommunehospitalet i Kjøbenhavn.

	Mænd med 1ste Udbrud af Syphilis.	Kvinder med 1ste Udbrud af Syphilis.	Samtlige veneriske Patienter.
1864	179	138	1,071
1865	190	167	1,036
1866	232	173	1,274
1867	191	147	1,189
1868	250	172	1,603
1869	266	175	1,731
1870	263	192	1,605
1871	252	195	1,270
1872	212	149	1,563
1873	164	109	1,463
1874	223	123	1,605
1875	205	157	1,312
1864—75	2,627	1,897	16,722