

	Mænd med 1ste Udbrud af Syfilis.	Kvinder med 1ste Udbrud af Syfilis.	Samtlige veneriske Patienter.
1876	187	164	1,348
1877	143	130	1,164
1878	148	137	1,352
1879	200	145	1,389
1880	264	201	1,670
1881	235	211	1,793
1882	241	207	1,962
1883	258	212	2,354
1884	257	213	2,120
1885	201	207	2,082
1886	223	182 (202)	1,747 (2,182)
1887	182	114 (190)	1,250 (2,274)
1876—87	2,539	2,123 (2,239)	2,023 (21,680)

Tallene i denne Tabel ere uddragne af Kommunehospitalets Aarsberetninger, dels fra Beretningen fra 4de Afdeling (de 2 første Kolonner) dels af den økonomiske Overfagt (3die Kolonne). Belægningsen paa 4de Afdeling omfatter alle veneriske fra Byen, som selv melde sig eller indlægges af Læger for at erholde fri Kur og Pleie, og disse udgjøre Hovedmassen af samtlige paa Afdelingen behandlede Veneriske, dernæst et Mindretal fra Byen, som yder Betaling, et andet Mindretal fra det øvrige Danmark eller Udlandet, som ligeledes yder Betaling, endvidere et vist Antal Provindsboere, som rejse til Kjøbenhavn, opholde sig her nogle Dage og derefter kræve fri Kur og Pleie. Endelig indlagdes her indtil 1886 de Kvinder af den hemmelige Prostitution, som af Politiet vare anholdte og fundne veneriske, samt saadanne løsgangte Kvinder, der uden at være indskrevne som offentlige, stode under Politiets Tilsyn, naar de besaf veneriske. Disse Kvinder ere i Aarene 1886 og 1887 bleve behandlede paa Kjøbenhavns Vestre Hospitals 2den Afdeling for at gjøre Tallene i Tab. V. 2den og 3die Kolonne, ensartede har man forrigeret Tallene for de to sidste Aar ved at addere Tallene fra Kommunehospitalet og Vestre Hospital; det forrigerede Tal er vedføjet i Parenthes. Tallene i 2den og 3die Kolonne lade sig vanskeligt benytte som Grundlag for et Skøn om Udbredelsen af veneriske Sygdomme i Kjøbenhavn i de to Perioder, fordi Politiets Virksomhed overfor den hemmelige Prostitution, som andetsteds paavist, ikke har været ensartet, men navnlig uforholdsmæssig betydelig i Aaret 1887, og der deraf resulterer ikke ubetydelige Svingninger i Antallet af indlagte veneriske og i Antallet af behandlede Kvinder med første Udbrud af Syfilis. Det vil imidlertid ses, at Forholdet mellem Totalsummen i hver af disse Kolonner ^{1897/2239} og ^{1872/21680} ikke afviger væsentlig fra Forholdet mellem de gennemsnitlige Foltetal i hvert Tidrum ^{181000/252000}. Større Vægt kan der derimod lægges paa Tallene for Mænd med 1ste Udbrud af Syfilis. Disses Antal er noget mindre i 2det end i 1ste Tidrum, hvad der sammenholdt med Gjennemsnitsbefolkningens betydelige Tilvæxt antyder en ret betydelig Aftagen af Sygdommen i det sidste Tidrum. Man bør dog først overveie, hvilken Indflydelse der maa tillægges 1) det ovenfor omtalte, udenbys hjemmehørende Element blandt de Veneriske 2) Lægernes Tilbøielighed til at behandle Syfilispatienter ambulatorisk eller i Hjemmet. Intet af disse Momenters Indvirkning kan belægges med Tal; om det sidste vides Intet, men det synes dog lidet sandsynligt, at det skulde være undergaaet en væsentlig Forandring i Løbet af det sidste Tidrum; angaaende det første er det mest sandsynligt at antage, at hint Element snarere er tiltaget end aftaget. Erfaringerne fra Kommunehospitalet synes altsaa at maatte gaa ud paa

at Syfilis viser mindre Udbredelse i Kjøbenhavn i Tidrummet efter 1875 end i Tidrummet 1864—75.