

Syphilis hos fødende Kvinder paa Fødselsstiftelsen i København.

Tab. VI.

	Fødende Kvinder.	Af de fødende Kvinder led af manifest Syphilis eller fødte syfilitiske Børn.
$\frac{1}{4}$ 65 — $\frac{81}{3}$ 66	1,182	22
" 70 — " 71	1,055	11
" 71 — " 72	1,066	19
" 72 — " 73	1,014	10
" 73 — " 74	1,115	7
" 74 — " 75	973	14
$\frac{1}{4}$ 65 — $\frac{81}{3}$ 66 og $\frac{1}{4}$ 70 — $\frac{81}{3}$ 75	6,405	83
$\frac{1}{4}$ 75 — $\frac{81}{3}$ 76	943	18
" 76 — " 77	1,004	12
" 77 — " 78	1,003	8
" 78 — " 79	1,063	8
" 79 — " 80	1,173	3
" 80 — " 81	1,140	13
" 81 — " 82	1,277	10
" 82 — " 83	1,385	7
" 83 — " 84	1,304	15
" 84 — " 85	1,424	8
" 85 — " 86	1,529	13
" 86 — " 87	1,141	8
$\frac{1}{4}$ 75 — $\frac{81}{3}$ 87	14,386	123

Aarsberetningerne for Tidsrummet 1866—70 indeholde ikke Oplysninger om Syphilis hos fødende Kvinder.

Tages den gennemsnitlige Sygeltighedskvotient for samtlige Aar tilsammen og beregnes, hvor mange Tilfælde af Syphilis man funde have ventet i hvert Tidsrum, faas i 1ste Tidsrum 63, i 2det 143, medens der foreandtes henholdsvis i 1ste Tidsrum 83, — 123.

Erfaringerne fra Fødselsstiftelsen tyde paa en mindre Udbredelse af Syphilis i Tidsrummet efter 1875 end i Tidsrummet før 1875.