

§ 12.

Frøets Renhed bestemmes i udtagne Gennemsnitsprøver („Middelpøver“), Bægten af disse samt Maaden, hvorpaa Middelpøveren udtages for de forskellige Frøsorter, ville, naar Sagen er nærmere undersøgt, blive meddelte. Indtil da fortsættes paa den hidtil fulgte Maade.

Drøftning finder kun Sted ved Raavarer, der indeholde en større Mængde løse Avner, f. Eks. Raavarer af Klappgræs- og Svene-Arter. Gennemsnitsprøven drøftes let (med Sikkerhed for, at godt Frø ikke udstødes) og vejes paany; af den gode Rest udtages en mindre Prøve til videre Undersøgelse. De ved Drøftningen udskilte lettere Dele undersøges kun summarist for at konstateres, at godt Frø ikke er fradrøftet.

§ 13.

Ved Renhedsbestemmelsen skelnes mellem A. rent Frø og B. fremmede Bestanddele.

Til rent Frø regnes alle til den paagældende Art hørende, ubestadigede Frø, uden Hensyn til deres større eller mindre Udvikling. Hvor der i en Prøve findes en større Del svage (eller misfarvede) Korn, skal disses Mængde særlic bestemmes. Et Indholdet af saadant svagt Frø 10 pCt. eller derover, lægges dette særstilt til Spiring med mindst 2×100 Korn.

Blandt fremmede Bestanddele skelnes mellem a. Ukrudtsfrø, b. Frø af andre dyrkede Planter og c. Affald, til hvilken sidste Kategori regnes Fragmenter af Planter og Frø, Jord, Sand, Smaasten, o. desl., samt bestadigede eller spirede Frø af den paagældende Frøsort.

§ 14.

Ved enhver Renhedsbestemmelse skulle Arterne af de i Prøven fundne ondartede Ukrudtplanter Frø bestemmes. Antallet pr. Kilogram af saadanne Frø beregnes, idet hele den indsendte Prøve, eller mindst $\frac{1}{5}$ Liter af større Frø og $\frac{1}{10}$ Liter af smaafornt Frø, gennemses. Saavel Art som Antal af flige Frø angives paa Analysebeviset.

Hvilke Ukrudtplanter der skulle betragtes som ondartede, vil senere blive meddelt.

§ 15.

Ved alle Angivelser vedrørende Procentmængden af Frøets Bestanddele benyttes, naar Værdien er 1 eller derover, kun een Decimal; er Værdien under 1, benyttes to Decimaler.

§ 16.

Til Bestemmelse af Spireevnen udtages af den omhyggelig blandede, renfede Del af Frøprøven 3 Gennemsnitsprøver à 200 Korn, hvilke Prøver hver for sig lægges til Spiring efter specielle Regler, som senere ville blive fastsatte af Ministeriet; indtil da benyttes den hidtil fulgte Fremgangsmaade med den nødvendige Hensyntagen til denne Paragrafs sidste Passus. Af Gennemsnittet af de tre Parallelbestemmelser beregnes Spireevnen.

Afviger nogen af Bestemmelserne over 5 pCt. fra Middeltallet, udføres en hel ny Bestemmelse. Skulde denne ogsaa give større Afvigelse end 5 pCt., anføres i Analysebeviset, at Spiringen er uregelmæssig. Nye Prøver lægges til Spiring, sa snart en tojnældende Uoverensstemmelse maatte vise sig under Spiringsforsøgets Forløb.

Ved Fastsettelsen af den specielle Spiringsmetodit bør Grundprincippet være Valg af de Metoder (Apparater, Temperatur o. s. v.), der for den enkelte Frøsorts Bedkommende give de højeste Spiringstal. Til Spiring af Draphavre, Gulaks og Fløjelsgræs, samt Esparfette og Senadela, lægger Kornene nøgne.

§ 17.

De Frø, der efter den for hver Frøsort fastsatte Tid endnu ikke have ired betragtes som ikke spiredygtige. Herfra undtages dog Vælgplanternes „haarde Korn, der anføres særstilt i Analysebeviset og medregnes ved Angivelsen af Spireevnen; fremdeles saadanne ikke spirende Frø af meget langsomt spirende Træfrøsorter, der ved Gennemstøring vise sig friske. Disse anføres særstilt som friske, men endnu ikke spirede.