

## § 3.

En fuldstændig Frøanalyse omfatter Bestemmelsen af Frøets a) Vægt, b) Renhed, c) Spireevne og d) Vægt.

## § 4.

Partielle Undersøgelser, omfattende et eller flere af de til en fuldstændig Frøundersøgelse hørende Momenter, kunne udføres paa Forlangende. Resultatet af saadanne Bestemmelser meddeles Indsenderen paa et særligt Slemma, paa hvilket der — med udhævet Tryk — angives, at en sliq Analyse kun er tjenlig til Orientering og ikke afgiver nogen Garanti for Varens Brugbarhed i det hele.

## § 5.

Frøets Vægt (Art, Varietet, Kulturform) bestemmes ved Hjælp af Kontrolens Mønstersamling, resp. Haandbøgerne i Frølære, eller, hvor dette er fornødent, ved særlige Dyrkningsforsøg. Naar Frøets Vægt kun lader sig bestemme paa denne Maade, gives der snarest Meddelelse herom til Indsenderen.

Erklæring om de indsendte Frøprøvers Udsæd maas kun afgives, hvor dette Forhold med Sikkerhed kan bedømmes ad analytisk Vej, resp. ved Dyrkningsforsøg. En Angivelse af tvivlsom Natur maas ikke findes paa Analysebeviset.

## § 6.

Paa Analysebeviser til Indlandet forlanges kun Angivelse af Frøsorternes danske Navne, undtagen hvor disse kunne give Anledning til Tvivl. Derimod skal altid anvendes latinske Navne paa Analysebeviser til Udlandet.

## § 7.

Bestemmelsen af Frøets „absolute Vægt“ (Vægten af 1,000 Korn) udføres saaledes: 3 Portioner à 200 Stkr. rene, hele, men ikke udsøgte Korn vejes, og Middeltallet af disse Vejninger multipliceres med 5.

Følgende Frøsorter vejes „nøgne“: Draphavre, Gulaks, Fløjsgræs (i Indre-avnerne), Eng-Nævehale, Esparfette og Senadela.

## § 8.

Før Vejningen af de 3 Gange 200 Korn underkastes disse en delvis Tørring efter Regler, som senere nærmere ville blive meddelte. Indtil da arbejdes paa den hidtil benyttede Maade.

## § 9.

Paa Analysebeviset angives den absolute Vægt i Gram; ved en Vægt af over 50 Gram i hele Tal, fra 50 til 10 Gram med 1 Decimal, under 10 Gram med 2 Decimaler.

## § 10.

Bestemmelse af Frøets Rumvægt (Hektolitervægt) er ikke obligatorisk for en fuldstændig Analyse, hvor tilstrækkelig Materiale er indsendt, forudsættes dog, at denne Bestemmelse udføres. Under Indsenderen udtrykkelig en sliq Bestemmelse, eller kræves Bestemmelsen ved „Efterundersøgelse“, skal den paagældende Prøve indeholde mindst  $1\frac{1}{2}$  Gang det til Bestemmelsen nødvendige Rumfang. Hvis Frøet indeholder fremmede Indblandinger, der væsentlig ville paavirke Rumvægten, maas de fjernes før Vejningen, og Oplysning derom gives paa Analysebeviset. Kan en saadan Rensning ikke udføres, bortfalder Rumvægtbestemmelse for sliqe Prøver, og Grunden hertil anføres paa Analysebeviset.

## § 11.

Korrektionstabeller til Beregning af Frøs virkelige Hektolitervægt ville blive udarbejdede og tilfillede Frøkontrollen. For Sæd benyttes den af den tykke „Normal Eichungs Kommission“ udarbejdede Korrektionstabel.