

Dette Forsøg tyder altsaa, ligesom Gutmanns, paa, at tuberkulose Røer faa kendelig Feber efter Indsprøjtning af moderate Doser af Koch's Lymfe. Det tyder tillige paa, at denne kunstige Feber fremmer Sygdommens Udvikling, dog lader der sig i saa Henseende naturligtvis ikke sluttes noget videre af eet Forsøg.

Min Forsøgsko havde en temmelig frisk Øvertuberkulose. Jeg havde valgt et Dyr med denne Lidelse for muligt at kunne iagttage en lokal Reaktion paa den tuberkulose Nydannelse i Righed med, hvad der er iagttaget paa Mennesker med Tuberkulose i Huden, Lymfekirtler og Led. I saa Henseende opnaaede jeg ikke noget bestemt Resultat; dog fik jeg det Indtryk, at Øvertuberkulosen i dette Tilfælde skred en Del mere hastigt frem, end det ellers plejer at være Tilfældet.

Paa samme Tid iudsprøjtede jeg en tuberkuløs Hund med 5 Centigram af Lymfen. Dette Dyr fik iugen kendelig Feber, men befandt sig tilsyneladende bedre i de næstfølgende Dage efter Indsprøjtningen.

Da jeg ikke kunde faa mere Lymfe her i Byen, og da der paa min Henvendelse i Berlin svarede mig, at man foreløbig ikke vilde udlevere Lymfe til Forsøg paa Dyr, maatte jeg indstille mine Forsøg. For kort Tid siden fik jeg imidlertid tilsendt Lymfe fra Berlin, og det er nu min Hensigt med det første at optage Forsøgene igen i saa stor Maalestof, som de meget indskrænkede Bladsforhold tillade det."

L. H. om sen.

---

Grøthan.