

tiden falder i Maj, Juni (og Juli), saa disse Unger ere meget unge. Individer paa 3—5 Tommer har jeg faaet paa samme Steder i ringe Antal allerede paa For sommeren; de maa være fødte i det foregaaende Aar og ere altsaa ca. 1 Aar gamle.

Seg maa antage, at der i Analogi med flere andre Glynderfisk maa optræde endnu en Aargang (mellem ca. 6—11 Tommer i Længde), før vi naa de voksne Fisk, og at Tungen saaledes er 3 Aar om at opnaa Modenhed. Hvor denne Aargang, 2-Gruppen, opholder sig, ved jeg ikke; men den maa utvivlsomt være at finde i Kattegat, rimeligvis paa dybere Vand.

Smaa Tungeunger, til Dels pelagiske, ere ved disse Undersøgelser fundne saa langt syd paa som Kerteminde og Fredericia; de fandtes kun i meget ringe Antal. Voksne Tunger ere i disse Egne, som overhovedet uden for Kattegat, saa sjældne, at mange gamle Fiskere aldeles ikke kende dem.

Paa Grund af disse sparsomme Oplysninger om Tungenes yngre Aldere er jeg ude af Stand til at afgøre, om Kattegat huser en egentlig selvstændig Tungebestand, eller om det maaste er ganske afhængigt af Skagerak i saa Henseende.

For øvrigt har man ogsaa fra de engelske Ryster kun sparsom Oplysning om Tungenes Yngel. Cunningham mener (loc. cit.), at denne ikke er knyttet saa udelukkende til Rysten som f. Eks. Rødspættens Yngel, hvilket synes at stemme med det af mig iagttagne. Paa dybere Vand kan saadan Yngel lettere blive uopdaget ved Undersøgelserne end paa det ganske lave Vand, hvilket maaste er Grunden til dens Sparsomhed paa Tabellen.

#### Den lille Tunge. (*Solea lutea*).

4 Individer paa  $1\frac{3}{4}$ —3 Tommers Længde af ovennævnte lille Tungeart fandtes mellem Yngel af *S. vulgaris*, som jeg i 1884 havde indsamlet ved Frederikshavn.

Den 13de Juli 92 fandt jeg et  $4\frac{1}{4}$  Tomme langt Individ øst for Væso paa 8 Favne Vand; endvidere fandtes i 1893 et Individ paa  $3\frac{1}{4}$  Tomme 4 Kvartmil NNO. for Albæk paa 5 Favne Vand den 8de Juli af „Hauch“, og 2 Individer paa  $3\frac{1}{8}$  og  $2\frac{3}{4}$  Tommer toges i Maj i det nordlige Kattegat af Bay om Bord paa „Hauch“. Den kendes ogsaa fra de jydsk Besterhavsryster. — Denne lille Tungeart er uden al Betydning for det praktiske Fiskeri; men den forveksles let med Yngel af den sædvanlige Tunge.

## II. Kapitel.

### Svovfor aftager Glynderfiskeriernes Udbytte i Karvandene inden for Skagen?

#### Fordi der fiskes for kraftig.

At Rødspættefiskeriet indenfor Skagen er taget betydelig af, saaledes at de i dette anbragte Kapitaler ikke forrentes saa godt, som dette tidligere har været Tilfældet, er jo desværre en uomtvistelig Kendsgerning, aabenbar for alle, der have noget med dette Fiskeri at gøre.

Man plejer at sige, at dette hidrører fra, at Rødspættebestanden er forringet ved det stærke Fiskeri; men det lader sig dog ogsaa tænke, at man i Aarenes Løb er kommen til at anvende for stor en Kapital i dette Fiskeri, saa at Fiskeriet ikke kan bære denne, uagtet maaste Bestanden er saa god som nogenstunde.