

Bilag 5.

Den stærke Dødelighed i Børnets 1ste Levemaaned fremgaar af følgende Dødelighedstal for 1880—89 efter Stat. Tab. 4de N. Lit. A.

Af 1.000. Levende ved Begyndelsen af hver Aldersklasse døde under Forløbet af samme for hele Danmark:

	Drenge.	Piger.
1ste Maaned	47,5	37,3
2den —	19,4	16,6
3die —	14,7	12,0

og Dødeligheden falder herefter fremdeles paa hver Maaned.

Ernæringens Indflydelse paa Børnedødeligheden vil fremgaa af følgende Statistik. I Berlin fandtes Dødeligheden 1885 i 1ste Maaned af Børnets Liv udtrykt ved følgende relative Tal:

	Brystbørn.	Børn opflastede med Komælk.	Børn opflastede med Mælketrogater.
I 1ste Leveaar.	20,3 %/oo 7,4 —	108,1 %/oo 42,1 —	270,4 %/oo 125,7 —

I Frankrig fandtes Dødeligheden blandt Glaskebørn:

		Gange saa stor som blandt Brystbørn		
2—14 Døgn	2,5	—	—	—
15—29 —	3,3	—	—	—
1—3 Må.	1,8	—	—	—
3—6 —	1,4	—	—	—
6—12 —	1,1	—	—	—

Den gavnlige Indflydelse af Lovbestemmelsen vil fremgaa af følgende Eksempler:

Børnedødeligheden fandtes:		1876—80.	1886—90.	Difference.
i Canton Zürich.....	4 Cantoner, som be- skæftige relativt flest kvinder i Industrien.	19,9	14,9	5
		17,1	14,5	2,6
		20,4	16,9	3,5
		25,1	19,9	5,2
Freiburg ..	4 Cantoner, som be- skæftige relativt færrest kvinder i Industrien.	21,9	20,1	1,8
		14,8	13,1	1,7
		17,0	16,1	0,9
		16,4	16,3	0,1

Bestemmelsen indførtes 1878, men gennemførtes først i de nærmest følgende Aar.

I Mülhausen var Børnedødeligheden i Arbejderfamilierne ved en Fabrik 39 %. Der indførtes nu en 6 Ugers Hvile efter Medkomsten med fuld Løn, og Dødeligheden sank straks til 25 %.