

Total Kassation ved akut Rødsyge og diffus Hudbrand samt ved Knuderosen i stærkere Grad (naar Knuderne ere til Stede i stor Mængde, saa de næsten falde sammen og gaa dybt i Spækket), og naar Kroppen er af slap og daarlig Konsistens.

*b. Andre Infektionssygdomme.*

1. Hestens ondartede Lungesyge. Total Kassation.
  2. Brandfeber. Total Kassation.
  3. Epizootisk Katarralefeber (rosenagtig Influenza) hos Hesten. Total Kassation.
  4. Kværke.
  2. Kl., naar Hesten er feberfri.  
Total Kassation, naar Hesten har Feber, eller Sygdommen har metastaseret.
  5. Septicæmia hæmorrhagica hos Kvæg (Vildtsyge, septisk Pleuropneumoni). Total Kassation.
  6. Croup (hos Kvæget). Total Kassation.
  7. Miltbrandsemfysem. Total Kassation.
  8. Malignt Ødem. Total Kassation.
  9. Tetanus. Total Kassation.
  10. Pyæmi og Septikæmi (herunder Osteomyelit). Total Kassation.
  11. Akut Navleinfektion. Total Kassation.
  12. Dysenteri og septisk Enteritis (saavel hos voksne som hos yngre Dyr). Total Kassation.
  13. Diarré hos Spædekælve. Total Kassation.
  14. Difteritis hos Kalve. Total Kassation.
  15. Tuberkulose\*).
1. Kl. paa Krop gives, naar Sygdommen er af *utvivlsom lokal* Natur og har Sæde i et enkelt Organ eller dettes Glandler, eller er til Stede i Lunge og Lever samtidig, og de tub. Processer ere af ringe Udstrækning; i begge Tilfælde forudsat, at Kød Kroppen er i god Ernæringstilstand.
  2. Kl., naar Sygdommen er af lokal Natur i et Organ, men har indvirket om end kun i mindre Grad paa Dyrets Ernæring,
    - naar Sygdommen er af lokal Natur og er til Stede i Lunge og Lever samtidig i større Udstrækning,
    - naar Sygdommen er af lokal Natur, men har bredt sig fra det angrebne Organs korresponderende Kirtler gennem Lymfebaner til en længere fra Infektionsstedet liggende Kirtelgruppe,
    - naar Sygdommen er af lokal Natur, men har Sæde paa Bryst- eller Bughinde eller begge samtidig; saa det bliver nødvendigt at aftrække den serøse Hinde,
    - naar Sygdommen er generaliseret, men Generalisationen kun giver sig til Kende ved enkelte *ældre* emboliske Tuberkler i Lunge og Lever eller i Milt eller i Nyrer; eller ved en *ældre* tub. Proces i en af Kødets Kirtler. (Hos Svinet bedømmes Tuberkulose i Nakke- og Bovkirtel dog ikke som Tegn paa Generalisation).
- Dampsterilisation kan tillades <sup>a)</sup> af hele Kroppen, naar Sygdommen er generaliseret, og Generalisationen viser sig ved ældre emboliske Tuberkler i større Antal i flere Organer samtidig; eller ved ældre tub. Processer i flere af Kødets Kirtler samtidig; <sup>b)</sup> af det skære Kød: ved Bentuberkulose og ved ældre Tuberkulose i Centralnervesystemet.
- Total Kassation i de her nævnte Tilfælde, for saa vidt kontrolleret Dampsterilisation ikke kan iværksættes,
- endvidere ved frisk generaliseret Tuberkulose, ved Tuberkulose i Muskulaturen, ved Bentuberkulose af større Udstrækning og i alle Tilfælde, hvor Tuberkulosen har bragt Dyret i afmagret Tilstand; eller Kroppen er af modbydeligt Udseende.

\*) Se i øvrigt den i det efterfølgende Bilag indeholdte Eksempelsamling.