

2. Svinetinten (*Cysticercus cellulosæ*).
Total Kassation.
Een- og faatintede Svinekroppe kunne med Hensyn til Kogning og Saltning behandles som anført ved tintede Oksekroppe. Hvor saadan Behandling ikke kan finde Sted, total Kassation.
3. Ekinokokken (*Echinococcus polymorphus*)...
 1. Kl. paa Kroppen.
 2. Kl. kan paasættes f. Eks. Leveren, naar denne kun huser en enkelt Ekinokok, som fjernes.
 Kassation af de angrebne Organer finder Sted, naar flere Blæreorm have Sæde i disse.
4. Kvæsen (*Coenurus cerebralis*).
 1. Kl. ved velnærede Dyr.
 2. Kl. ved mindre velnærede Dyr. } Kassation af Hovedet.
5. *Cysticercus tenuicollis*.
 1. Kl. paa Kroppen, naar Parasitten kun er til Stede i enkelte Eksemplarer paa et eller flere Organers Overflade. Parasitten fjernes.
 2. Kl. paa Kroppen, naar Parasitten findes i stort Antal og det ikke blot paa Organernes Overflade, men ogsaa paa Bugvæg og eventuelt paa Brystvæg; eventuelt Fjernelse af Bugvæg og Aftrækning af Pleura Costalis. De angrebne Organer kasseres.
6. Tænier hos Faaret. 2. Kl., naar Dyret er magert, ellers 1. Kl.
7. Trikiner (*Trichina spiralis*). Trikinøse Kødvarer kasseres.
8. Strongylider i Luftvejene hos Kvæg, Faar, Ged og Svin og i Fordøjelseskanalen hos Kvæg, Faar og Ged.
 1. Kl., naar Dyret er ved godt Huld (det angrebne Organ kasseres).
 2. Kl., naar Dyret er ved mindre godt Huld (det angrebne Organ kasseres).
 Total Kassation, naar Dyret er i afmagret Tilstand.
9. *Strongylus armatus* (under Bughindebeklædningen paa Hestens Flommer).
 1. Kl. af Kroppen. Ere Parasitterne til Stede i stor Mængde i Flommerne, kasseres disse (eventuelt Bugvæggen); ere de til Stede i ringe Mængde, fjernes de fra Flommerne; se Ormetrombose.
10. *Anchylostomum bovis*. Tyndtarmen kasseres.
11. *Pseudalius capillaris* i Faarets Lunger.
 1. Kl., naar Faaret er ved godt Huld; Lungerne kasseres.
 2. Kl., naar Faaret er magert; Lungerne kasseres.
 Total Kassation af Krop og Organer, naar Dyret er bragt i kakaktisk Tilstand.
12. *Pentastomum*. Kassation af det af Parasitten angrebne Organ, Krøs, Lever osv.
13. Ikter:
 - a. Hos Oksen. Findes der kun faa Ikter i Leverens venstre Lap, afskæres denne, og Resten af Organet stemples med 2. Kl.
Ved udbredt Iktelidelse i Leveren eller Ikteabscesser i Lungen kasseres de angrebne Organer. Krop 1. Kl.
 - b. Hos Faaret. 1. Kl. paa Krop og Kassation af Leveren ved lokal Leverlidelse.
2. Kl. paa Krop, naar Dyret er ved mindre godt Huld.
Total Kassation, naar Dyret er kakaktisk.
14. Larven af Oksens Hudbræmse (*Hypoderma bovis*).
 1. Kl. eventuelt efter Udrensning af Rygmuskulaturen. Ved Parasittens Tilstedeværelse i Rygmarvskanalen udrenses denne; angrebne Spiserør kasseres.
15. Sarkosporidier.
 2. Kl. paasættes Kroppen, naar kun enkelte Dele af samme ere Sæde for Parasitten; de angrebne Dele fjernes.
 Total Kassation finder Sted, naar Parasitterne findes i stort Antal overalt i Muskulaturen (Faar, Svin, Okse, Hest.) Ved Sarkosporidier (*Balbantia*) i Mavepiben, Kassation af denne.