

Eksempler paa Fremgangsmaaden ved Bedømmelsen af de hyppigere forekommende Former af Tuberkulose.

| I. Hos stort Kvæg. | Udrensning. | Bedømmelse af Organer. | | | Kroppen. |
|--|---|---|-------------------------|--------------------------|----------|
| | | 1. Kl. | 2. Kl. | Kasseres. | |
| 1. Retrofaryngeale*) eller Supmaksillære Glandler. | Angrebne Gl. fjernes; ere de retrof. Gl. tub., fjernes tillige det i Forbindelse med Tungen værende Parti af Svælget. | Hjerteslag og Lever. | Hoved og Tunge. | | 1. Kl. |
| 2. Retrofaryngeale og Submaksillære Glandler: a. Processerne mindre og tørre. b. do. større og kavernøse. | a. Luftrørshoved, Svælg og Tungeben fjernes fra Tungen ved dennes Rod. b. do. større og kavernøse. | a. { Hjerteslag og b. { Lever. | a. Hoved og Tunge. | b. Hoved og Tunge. | do. |
| 3. Retrofaryngeale eller Submaksillære Glandler og subparotideale Glandler. | De submaksill. Gl. eller de retrof. Gl. tilligemed Svælget fjernes. | Hjerteslag og Lever. | Tunge. | Hoved. | do. |
| 4. Retrofaryngeale eller Submaksillære Glandler og mesenteriale og portale Glandler samt ældre Tuberkler i mindre Antal i Leveren. | jfr. 3. | Hjerteslag. | Hoved og Tunge. | Lever og Krøs. | do. |
| 5. Mere udbredt tub. Bronkopneumoni og tub. deg. Bronkial-Mediastinal Retrof- og Mesent. Gl. — Krop velnæret. | | Lever. | Hoved, Tunge og Hjerte. | Lunger og do. | do. |
| 6. Mindre udbredt tub. Bronkopneumoni og tub. deg. Bronkial-Mediastinal Retrof- og Retrof- event. tub. Mesent. Gl. — Krop ikke mager. | jfr. 3. | Lever. | Hoved, Tunge og Hjerte. | do. og event. Krøs. | do. |
| 7. Mindre udbredt tub. Bronkopneumoni og tub. deg. Bronkial-Mediastinal Retrof- og Portal-, Mesent- og Retrof-Gl.; event. till. et mindre Antal ældre Tuberkler i Leveren. | do. | | Hoved, Tunge og Hjerte. | Lunger, Krøs og Lever. | do. |
| 8. Lokal Tub. udgaaende fra Saar i Hud eller fra Mundslimhinde, de tilsvarende Gl. tub. | Lokal Kassation af de angrebne Dele. | Hjerteslag og Lever, event. Hoved, Tunge. | | Eventuel Hoved og Tunge. | do. |
| 9. Tub. Skamglandler hos en Tyr eller Stud og lokale tub. Forandringer paa Kønsorganer. | Skamglandlerne fjernes. | Hoved, Tunge, Hjerteslag, Lever. | | De angrebne Kønsorganer. | do. |

*) I Skemaet ere følgende fremmede Betegnelser benyttede for Glandelgrupper: Submaksillære Glandler d. e. Købekulens Lymfekirtler; retrofaryngeale Gl. d. e. Lymfek. bag Svælget; subparotideale Gl. d. e. Gl. i og under Ørespytkirtlen; Bronkialgl. d. e. Gl. ved Luftrørets Deling; Mediastinalgl. d. e. Gl. i Brvstskillevæggen foran og bagved Luftrørets Deling; Portalgl. d. e. Leverportens Gl.; Mesenteriale d. e. Krøskirtlerne