

1900—09. Fra Midten af denne Periode, altsaa fra ca. 1905, og til 1911, hvilket Aar den første Beregning angaar, er Befolkningen forøget med ca. 7 pCt. Regner man med en tilsvarende Forøgelse af de døde, kommer man til det Resultat, at der nu dør hvert Aar 16,500 Mennesker over 15 Aar af kroniske Sygdomme.

Ifølge Opgivelser fra forskellige Læger kan den Tid, der ligger imellem det Tidspunkt, da en kronisk Sygdom er saa vidt fremskreden, at den kan konstateres ved en Lægeundersøgelse, og Dødens Indtræden, i Gennemsnit ikke ansættes til mindre end 10 Aar, maaske nærmest ca. 12 Aar. Regner man med Middeltallet herimellem, altsaa 11 Aar, og anvender man dette Tal paa det fundne Antal Personer over 15 Aar, som dø af kroniske Sygdomme (16,500), kommer man til det Resultat, at 181,500 Mennesker paa hvert givet Tidspunkt ere lidende af kroniske Sygdomme.

Dette Tal er dog et Minimumstal. For det første er der sandsynligvis et ikke ringe Antal Personer, der ere lidende af kroniske Sygdomme, men som dø af akutte Sygdomme, og som derfor paa Dødsattesterne i mange Tilfælde opføres som døde af den akutte Sygdom, uden at det maaske meddeles, at den kroniske Sygdom har været medvirkende Dødsårsag. Af de henimod 1,000 Mennesker, som aarlig berøve sig Livet, eller som omkomme ved Ulykkestilfælde, er der sikkert ligeledes mange (særlig blandt Selvmorderne), som ere lidende af kroniske Sygdomme eller paa anden Maade ere Arbejdsinvalid. Af de sindssyge, som ogsaa maa regnes for lidende af en kronisk Sygdom, dø naturligvis adskillige af akutte Sygdomme. Det samme er Tilfældet med blinde, døvstumme og aandsvage, som ligeledes i Almindelighed vel ikke kunne blive optagne i de foreslaaede A.-Afdelinger af Sygekasserne. Hertil komme yderligere de vanføre og lemlæstede, som ligeledes alle ere Arbejdsinvalid, selv om de ikke lide af nogen egentlig kronisk Sygdom. Endelig er der i ovenstaaende Beregning ikke medregnet som kronisk Sygdom „Alderdomssvaghed“ (marasmus senilis), men det er dog højst sandsynligt, at et meget stort Antal af de 2,000 à 3,000 Mennesker, som aarlig dø heraf, har været lidende af en kronisk Sygdom i kortere eller længere Tid inden Døden (jfr. det ovenfor anførte, at ca. to Trediedele af alle over 70 Aar lide af kroniske Sygdomme). Hertil kommer yderligere den Omstændighed, at vistnok et ikke saa helt ringe Antal Personer med kroniske Sygdomme helbredes for den kroniske Sygdom. Dette gælder bl. a. Tuberkulosen, om hvilken Sygdom det efter en af Statens statistiske Bureau foretagen Undersøgelse med runde Tal er anslaaet, at omtrent Halvdelen af alle Tilfælde medfører Døden før eller senere¹⁾. Den anden Halvdel af de af Tuberkulose angrebne Personer skulde altsaa blive helbredet for Sygdommen eller dø af andre Sygdomme end Tuberkulose. Mange af disse dø naturligvis af kroniske Sygdomme, men adskillige dø sikkert af akutte Sygdomme.

Det vil heraf ses, at det, for at finde det samlede Antal Personer med kroniske Sygdomme, vil være nødvendigt til det ovenfor fundne Tal (181,500), der er beregnet paa Grundlag af Dødsfaldene efter kroniske Sygdomme, at lægge et ikke ringe Tillæg. Der dø aarligt ca. 26,000 Mennesker over 15 Aar. Af disse dø, som ovenfor paavist, ca. 16,500 af kroniske Sygdomme. Resten af Dødsfaldene, 9,000 à 10,000, skyldes altsaa akutte Sygdomme, Ulykkestilfælde eller Selvmord. Man kan vistnok regne, at der af disse er ca. 4,000, altsaa godt og vel en Trediedel, der ere eller have været lidende af en eller anden kronisk Sygdom eller Legemssvaghed. Gennemsnitsvarigheden af disse Menneskers kroniske Sygdomme kan man naturligvis ikke ansætte saa højt som Varigheden af de kroniske Sygdomme, som medføre Døden. Regner man med en Varighed, der er halvt saa stor, altsaa en 5—6 Aar, kommer man til det Resultat, at der findes ca. 22,000 Mennesker med kroniske Sygdomme eller Legemssvagheder, som dø af akutte Sygdomme m. m. Dette Antal, lagt til det ovenfor fundne Antal kronisk syge, som dø af Sygdommen (181,500), giver til Resultat, at der paa hvert enkelt Tidspunkt skulde findes lidt over 200,000 Mennesker over 15 Aar med kroniske Sygdomme eller Legemssvagheder, et Resultat, som ikke ligger saa langt fra det paa Grundlag af skønsmæssige Procenttal fundne, ca. 231,000.

Opløser man Dødsfaldene efter kroniske Sygdomme i Grupper efter Sygdommens Art, naar man til et lignende Resultat. Af de vigtigste kroniske Sygdomme dø der i hele Landet aarligt følgende Antal:

¹⁾ Tuberkulosens Udbredelse i Danmark i Aaret 1906 (Statistiske Meddelelser, 4. R. 26. Bd., H. VIII).