

Oplysninger over Sygelighedsforholdene (Sygedagenes Størrelse m. m.) for de enkelte Former af kroniske Sygdomme eller for hele dette Begreb under eet er meget vanskelige at skaffe. Stor Forsigtighed ved Fastsættelsen af Optagelsesbetingelserne vil derfor være paa sin Plads.

For at Folketingsudvalget angaaende Forslag til Lov om anerkendte Sygekasser imidlertid kan faa Lejlighed til ved Eksempler at faa at vide, hvilke Arter af kroniske Sygdomme man har tænkt sig at kunne tilstede Adgang til B-Afdelingerne, skal jeg forsøge at nævne en Del saadanne, idet jeg dog udtrykkelig betoner, at det fremførte udelukkende hviler paa mit eget Skøn — om jeg end ved mig i Overensstemmelse i saa Henseende med de Læger, der havde Sæde i Sygekasseudvalget —, og at den anførte Fortegnelse ikke giver sig ud for at være udtømmende.

I Almindelighed gælder det, at man ikke uden videre kan fastslaa, at visse bestemte Sygdomme enten tillader eller udelukker Optagelse i B-Afdelingerne. En Mængde kroniske Lidelser, som, naar de er til Stede i højere Grader (ondartet Form, senere Stadier af Sygdommen o. s. v.), vil udelukke fra Optagelse, kan i deres ringere Grader og i godartede Former meget vel tillade Optagelse. Meget ofte er de kroniske Sygdomme til Stede i skjult Form (latente), d. v. s. de har ikke givet tydelige Kendetegn; deres Bæreres Sygelighedsrisiko er under disse Forhold nærmest som raske Menneskers, blot med den Risiko, at den kroniske Lidelse kan komme til alvorligt Udbrud under Forløbet af andre, den ellers uvedkommende, alvorlige akutte Sygdomme.

Idet disse Synspunkter maa anlægges paa det efterfølgende, skal jeg nævne en Række kroniske Lidelser, som efter mit Skøn maa kunne finde Optagelse i B-Afdelingerne:

Visse konstitutionelle Sygdomme i mildere Former f. Eks. Stofskiftelidelser (urinsur Stofskiftelidelse, den urinsure Gigt, Tilbøjelighed til overdreven Fedme, for rigelig Bloddannelse o. l.), alm. Rheumatisme (herunder ikke vansirende Leddegigt) 2 eller 3 tidligere vel konstaterede Tilfælde af Gigtfeber, selv om vedkommende er rask i Øjeblikket; Sukkersyge hos voksne i mildere Grad, Blegspot, Blødersygdom, lettere Grader af Skørbug, Syfilis (naar den har været behandlet mindst 3 Aar meto- disk af Læge), engelsk Syge og dens Følger, Kirtelsyge i lettere Grad.

De fleste kroniske Hudsygdomme vil ikke hindre Optagelse i A-Afdelingerne. Visse kroniske Hudlidelser kan dog medføre væsentlig Indskrænkning i Arbejdsevnen og maa derfor henvises til B-Afdelingerne f. Eks. hyppig tilbagevendende og stærkt udbredt Skæl-Ringorm (Psoriasis), meget udbredte kroniske Eczemer, den godartede Lupus (Lupus erythematosus) o. l.

Lettere Grader af Aareforkalkning; sværere Former af Aareknuder, særlig paa Benene, med eller uden kronisk Skinnebenssaar.

Udhelede Tilfælde af Knogletuberkulose, afløbne tuberkuløse Ledlidelser f. Eks. i Hofte, Skulder, Fodled, Haandledd o. s. v., naar der ikke findes materieafsondrende Fistler. Rygradsskævheder og Pukkeldannelser af højere Grader efter forløben Rygradstuberkulose under samme Betingelser. Sygelige Forandringer efter ikke-tuberkuløse Benmarvsbetændelser (Osteomyelitis), Knoglesvulster, der ikke er tuberkuløse eller kræftagtige.

Godartede Kirtelsvulster (ikke kræftagtige eller forbundne med Blodlidelser f. Eks. leukæmiske).

Aandssvaghed eller -sløvhed i lettere Grad. Medfødte eller erhvervede Lamheder af Lemmerne f. Eks. efter Børnelamhed, Klumpfod i højere Grad, enkelte visne Lemmer; de lettere Nerveidelser f. Eks. afgrænsede Nervebetændelser (Ischias o. l.); alm. Nervøsitet og Nervesvækkelse (Neurastheni), Hysteri, Ligfaldskramper (Epilepsi) i lettere Grad. Lettere Tilfælde af Basedows Sygdom, nervøs Hovedpine, kronisk Nikotinforgiftning, kronisk Kaffeforgiftning, kronisk Alkoholisme i lettere Grad.

Blindhed, Døvstumhed, kronisk Ørebetændelse med eller uden Øreflod.

Hjærtelidelser f. Eks. Klappefejl, som er kompenserede, eller som ikke giver sygelige Tegn (latente).

Kroniske Strube- og Svælgidelser (som ikke er tuberkuløse eller kræftagtige), kronisk Luftrørskatarrh (kronisk Bronchitis) med eller uden lettere Grader af Lungeudvidning (Emfysem). Helbredede Lungetuberkuloser eller Lungehindetuberkuloser, selv om der er visse ikke-tuberkuløse Følger eller Forandringer tilbage efter Hovedlidelsen. De lettere Grader af den ægte Asthma (Asthma bronchiale).