

De lettere og mellemsvære Grader af Mave- og Tarmkatarrh, de lettere Grader af Mavesaar, Tyktarmskatarrh, de sværere Tilfælde af Brok, 2 eller 3 tidligere Anfald af Blindtarmsbetændelse (selv om vedkommende er rask i Øjeblikket). Galdesten, som ikke giver hyppige Anfald af Smerter eller Betændelse. Hyppige hæmorrhoidale eller andre Blødninger fra Endetarmen, som ikke skyldes kræftagtige Lidelser.

De lettere Grader af kronisk Nyrebetændelse f. Eks. efter Skarlagensfeber (Brights Sygdom, Nyreskrumpning). Nyregrus eller Nyresten eller Blæresten, som ikke giver hyppige Anfald af Smerter eller Betændelse. Kronisk Blærebetændelse.

Prostatahypertrofi i højere Grad. Kronisk Dryppert med eller uden Urinrørsforsnævring. Kronisk Betændelse (ikke tuberkuløs eller kræftagtig) af Moderskeden, Livmoderen, Æggelederne, Æggestokkene og de tilgrænsende Dele af Underlivet.

Det vil heraf fremgaa, at de 2 alvorligste (og hyppigste) kroniske Lidelser, Tuberkulose (undtagen visse Former af Kirtel- og Knogletuberkulose) og Kræft ikke er tænkt medtaget i B-Afdelingerne.