

Underbilag.Afskrift.

Den kongelige Veterinær- og Landbo-  
højskoles ambulatoriske Klinik.

København V., den 31. Januar 1914.

Til Direktøren for Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,  
Hr. Hofjægermester *F. Friis*,  
K., Dbm. p. p.

Idet vi undertegnede hermed tilbagesender den os tilstillede Skrivelse, i hvilken Landbrugsministeriet under 14. ds. har afæsket os en Udtalelse om „Betydningen af Bedøvelse ved Kastration af Husdyr og om Hensigtsmæssigheden heraf“, tillader vi os at erklære:

at Kastrationen hos de mest følsomme af vore Husdyr — nemlig Hesten, Hunden og Katten — medfører en overordentlig stærk, omend kortvarig Smerte, som man meget godt kan ophæve eller nedsætte væsentlig ved en Bedøvelse, der ikke medfører nogen større Fare for de paagældende Dyr.

For Hestens Vedkommende kan man — da Operationen tager saa ringe Tid — udføre Kastrationen, medens Dyret er i den omtaagede, delvis bevidstløse Tilstand, som indtræder allerede efter kortvarig Indvirkning af en forholdsvis ringe Mængde Kloroform, og en Bedøvelse af denne Art rummer kun en meget ringe Fare. Denne stiger derimod betydeligt, naar det er nødvendigt at anvende en langvarig eller meget dyb Narkose.

Dette, at man — efter vor Mening — kan nøjes med en forholdsvis ringe Mængde Kloroform, naar denne gives paa et passende Tidspunkt, gør det muligt for Dyrlægen at overvaage Bedøvelsen samtidig med, at han forbereder og udfører Operationen. Dyrlægen vil derfor i Regelen ikke behøve sagkyndig Assistance, selv om Bedøvelsen skal anvendes ved denne saa hyppigt benyttede Operation.

Fra anden Side har man indvendt mod Bedøvelse ved Kastration, at Indledningen af Narkosen medfører saa stor Ængstelse og Ophidselse hos Dyret, at Bedøvelsen bliver fuldt ud saa ubehagelig som selve Operations-Smerter. Dette kan vi ikke indrømme. Ved Anvendelse af formaalstjenlige Kloroformerings-Apparater og ved smaa Mængder af Kloroform bliver Dyrene i Regelen ikke meget urolige, og der er for os ingen Tvivl om, at det Ubehag, som Kloroformeringen fremkalder, ikke kan sidestilles med den overmaade stærke Smerte, som selve Gennemskæringen eller Gennemknusningen af den meget følsomme Sædstreng medfører, naar Operationen sker uden Bedøvelse. Smerterne ved Kastrationen vil være saa meget stærkere og Betimeligheden af Bedøvelsen saa meget desto større, jo mere udviklet Dyrets Hingste-Natur er. Ved Kastration af ældre Hingste og saadanne, som har været benyttede til Bedækning, vil en dybere Narkose derfor være ønskelig. Derimod vil det formentlig kunne forsvares at undlade Bedøvelse hos Føl, som bliver kastreret, inden de har naaet 6—8 Maaneders Alderen. Hos saa unge Dyr er Smerterne ved Operationen øjensynligt langt mindre end hos ældre, mere udviklede Individuer.