

Arealet for Sukkerroernes Vedkommende har holdt sig nærmest konstant. Kun Kaalrabi, der mellem 1912—15 viste en ret betydelig Tilbagegang, er siden i Fjor gaaet frem med 9 000 ha — og endelig er Cikorierødder gaaet relativt stærkt frem.

Tabel 3. Rødfrugtarealer.

	1916		1915		1912	
	ha	Tdr. Ld.	ha	Tdr. Ld.	ha	Tdr. Ld.
Kartofler	64 360	116 679	66 561	120 664	61 141	110 841
Runkelroer	111 966	202 984	123 286	223 497	83 751	151 831
Kaalrabi	99 536	180 448	90 421	163 918	102 580	185 961
Turnips og andre Foderroer	60 708	110 057	65 747	119 188	67 510	122 386
Gulerødder	6 648	12 051	6 907	12 521	8 003	14 508
Sukkerroer	31 478	57 066	32 056	58 112	32 370	58 682
Cikorierødder	1 405	2 548	854	1 547	1 002	1 814
Tilsammen...	376 101	681 833	385 832	699 447	356 357	646 023

Bælgsædarealer, Frøarealer m. m.

Til Slutning meddeles i Tabel 4 en Oversigt over Tællingsresultaterne for andre Høstarealers Vedkommende: ren Bælgsæd, Boghvede samt Frøarealer. Under eet betragtet er disse Arealer forøgede med 3 500 ha, idet deres samlede Areal, som i

Tabel 4. Bælgsædsarealer, Frøarealer m. m.

	1916		1915		1912	
	ha	Tdr. Ld.	ha	Tdr. Ld.	ha	Tdr. Ld.
Ren Bælgsæd	4 366	7 916	3 003	5 443	4 014	7 227
Boghvede til Moden- hed	3 777	6 846	3 301	5 985	2 422	4 389
Runkelroefrø	1 169	2 120	15 167	27 495	1 310	2 375
Kaalrabifrø	949	1 721			661	1 196
Turnipsfrø	1 327	2 405			884	1 601
Kløver, Rundbælg m. m.	1 068	1 936			667	1 209
Græsfrø	12 397	22 474			12 245	22 203
Tilsammen...	25 053	45 418	21 471	38 923	22 203	40 200

Fjor opgjordes til 21 500 ha, ved Tællingen den 15. Juli i Aar var 25 000 ha. Fremgangen har fundet Sted for saavel Bælgsæd og Boghvede som for Frøavlsarealer; de sidste udgjorde ca. 17 000 ha i 1916 mod 15 000 i Fjor.