

saa stærkt paa de stenede Grundkanter, hvor Dykkerne særlig arbejder, og hvor Planten i sin Vækst og Udbredelse minder om en veldyrket Kartoffelmark og derfor ganske hindrer Dykkerne i deres Søgen efter Østers paa Fjordbunden.

Til disse 2 Kalamiteter kommer yderligere den, at Bestanden viser sig at være taget betydelig af. Hvor stor denne Aftagen var, kunde man vanskelig danne sig noget bestemt Skøn om i selve Østerssæsonen, da den megen Dødtang hindrede en nærmere Undersøgelse, men de 2 første Maanedes Fiskeri af Sæsonen 1923—24 viser desværre, at Bestandens Aftagen er stor, idet der findes en Mængde tomme, sammenhængende Skaller, hvor Bunden før var dækket af Dødtang. Jeg tror ikke, Dødtangen har været Skyld i den store Dødelighed, idet Tangen vistnok kun meget faa Steder fandtes i saa stor Mængde og i saa tykt Lag, at Østersen ligefrem skulde være blevet kvalt, jeg tror snarere, Dødeligheden er forårsaget ved, at den Sygdom, som efter Sigende for flere Aar siden dræbte store Dele af den engelske, hollandske og franske Østersbestand, ogsaa har fundet Vej ind i Limfjorden. Men lige saa vel som Sygdommen i ovennævnte Lande forlængst er et overstaet Stadium, mener jeg, det samme er Tilfældet herhjemme ogsaa.

Da Fiskeriet som ovenfor nævnt gav betydelig mindre end beregnet, og da Afsætningen ikke faldt i tilsvarende Grad, maatte man allerede rationere Handelen i November Maaned. Da denne Rationering imidlertid ikke var tilstrækkelig, søgte jeg det høje Ministerium om Tilladelse til midlertidig at importere hollandske Østers og sælge disse, medens vi ved fortsat Skrabning og Dykning samlede tilstrækkelig stort Lager til den resterende Del af Sæsonen.

Naar jeg ønskede at importere hollandske Salgsøsters, var Grunden dels den, at jeg gerne vilde bevare Kontakten med alle Forhandlerne, hvilket ikke let kunde lade sig gøre under en Stilstandsperiode i Salget af Limfjordsøsters, og dels fordi jeg mente, at hollandske Østers, der kom i Vognladninger direkte hertil og straks blev udlagt i Bassinerne paa Ørodde, kunde tilbydes Forbrugerne i langt friskere Stand end de Smaa-sendinger, som den enkelte Fiskehandler selv tager hjem. Imidlertid viste det sig, at Efterspørgselen efter den hollandske Østers herhjemme var meget ringe, saaledes at denne Forretning gav et Underskud paa ca. 10 000 Kr. og altsaa ikke opfordrer til Gentagelse.

Regnskabet for de opfiskede Østers stiller sig saaledes:

Opfiskede Salgsøsters.....	2 541 753	Stkr.
Deraf fra Udlægskbankerne.....	390 100	—
Opfisket og genudlagt Yngel.....	394 350	—
Solgt Østers, anvendt til Reklame, Erstatning, Gaver, Hofholdning ...	2 526 403	—
Døde og bortkastede.....	15 350	—

og hoslagt følger en Liste over de Afdelinger, hvori der er fisket og hvor meget i hver.

Som det fremgaar af Tallene var af Fiskeriet paa de naturlige Banker de 87 pCt. Salgsøsters og 13 pCt. Yngel, medens paa de anlagte Banker de tilsvarende Tal er ca. 72 og 28.

Hvad Indførelsen af den rationelle Drift angaar, blev Arbejdet i Klovvig fortsat i den tidligere angivne Retning. En mindre Dæmning, ca. 650 Meter lang, blev opkastet inde i Vigen, begyndende Nord for den vestlige Sluses Indløb og løbende i en Afstand af indtil 200 Meter fra Vigens sydvestlige Side. Denne Dæmning skulde dels lede Vandet i en bestemt Retning, dels danne et begrænset Areal at arbejde paa, og hvor Temperaturen under nogenlunde gunstige Forhold skulde kunne opnaa den nødvendige Højde, mindst 18° Celsius. De indenfor denne Dæmning udlagte Moderøsters ynglede ogsaa stærkt, saaledes at der paa et Tidspunkt fandtes megen svømmende Yngel i Vigen, men den Kuldeperiode, der afløste de i Juli Maaned meget varme ca. 10 Dage, har antagelig dræbt saa godt som al Yngelen. Paa Grund af den megen fugtige Eftersommer og do. Efteraar har det til Dato imidlertid ikke været muligt at sænke Vandstanden i Vigen saa meget, at man har kunnet undersøge Bunden ganske nøje, saaledes at der endnu er Mulighed for, at der kan have sat sig Yngel fast paa de i dette Øjemed udsatte Fangere m. m., men denne Mulighed er kun ringe, og i hvert Fald har Undersøgelserne hidtil godtgjort, at der ikke kan have afsat sig Yngel i stor Stil, saaledes at man ogsaa for dette Aars Vedkommende maa sige, at Forsøgene i Klovvig er slaet fejl.

I Bassinerne paa Ørodde har man prøvet at overføre de saakaldte Conway-Forsøg, og ogsaa her var Vandet paa et Tidspunkt ganske fyldt med svømmende Østerslarver, som imidlertid døde alle sammen, antagelig forårsaget af et Temperaturfald paa 9 à 10 Grader i Løbet af faa Dage efter ovennævnte Varmeperiode. Endskønt Resultatet altsaa begge Steder har været meget daarligt, mener jeg dog ganske bestemt, den