

væggen at anlægge en Mavefistel, d. v. s. en Aabning ind til Mavesækken, og Patienterne maa da gennem denne Aabning ved Hjælp af et Gummirør indføre Føden i Mavesækken. Det er netop ved saadanne Spiserørsforsnævninger, at den for kort Tid siden af Professor Røvsing angivne Operation Øsophagoplastik med Dannelse af et kunstigt Spiserør kommer til Anvendelse. Det er navnlig Ætsninger med Kali- og Natronlud og med de stærke Syrer, som fremkalder disse Spiserørsforsnævninger. Hvor mange Tilfælde af denne Art der aarlig kommer til Behandling paa Landets Sygehuse, kan ikke opgives bestemt, men det drejer sig om et ikke ringe Antal. Kommissionen har for at belyse Forholdet indhentet Oplysninger fra en enkelt kirurgisk Afdeling — Afdeling C paa Rigshospitalet — om Antallet af Patienter, der i de sidste 14 Aar her er behandlet for Spiserørsforsnævring, om disses Alder, Aarsagen til Lidelsen og den anvendte Behandling. Tilfældene er anført paa nedenstaaende Liste:

Nr.	Alder.	Aarsag.	Behandling.
1	4	Sæbelud.....	Mavefistel.
2	2	Ætsning?	Mavefistel.
3	13	Natronlud 5 Uger før Indlæggelsen....	Mavefistel.
4	58	Natronlud 3 Aar før Indlæggelsen....	Udblokning.
5	2	Saltsyre 4 Uger før Indlæggelsen.....	Udblokning.
6	5	Ætsende Vædske 5 Uger før Indlæggelsen	Udblokning.
7	31	Natronlud ½ Aar før Indlæggelsen....	Mavefistel, senere Øsophagoplastik.
8	2 ³ / ₄	Natronlud	Mavefistel.
9	40	Natronlud 2 Aar før Indlæggelsen....	2 Maaneder efter Forgiftningen Mavefistel. Død 2 Aar senere i Tilslutning til Operation.
10	5	Natronlud 5 Md. før Indlæggelsen.....	
11	18	Natronlud	Øsophagoplastik.
12	44	Salpetersyre (Selvmordsforsøg)	Øsophagoplastik. Død.
13	4	Sæbesyderlud 5 Uger før Indlæggelsen.	Øsophagoplastik.
14	5	Saltsyre.....	Under Behandling.
15	2 ¹ / ₂	Natronlud 2½ Md. før Indlæggelsen...	Mavefistel.
16	21	Saltsyre for 11 Aar siden.....	Mavefistel 2 Maaneder efter Ulyk- kestilfældet. Nu under Behand- ling.

Et af ovennævnte Tilfælde skyldtes Selvmordsforsøg, de andre Føjtagelser. Det vil ses, at over Halvdelen af Patienterne er Børn. Mange af disse Forgiftninger vilde sikkert være undgaaet, hvis Flaskerne paa tilstrækkelig tydelig Maade havde baaret en advarende Paaskrift, idet de i saa Fald næppe var stillet hen paa Steder, hvor Børnene kunde faa fat i dem. Hvor langvarige disse Lidelser kan være, før Døden befrier Patienterne for deres Lidelser, viser Tilfælde 16; denne Patient har i 11 Aar maattet indføre sin Føde gennem en Aabning i Bugvæggen ind til Mavesækken.