

i Jylland, der enten allerede er rensset, eller som for Tiden er under Udrensning, i alt 157 Kredse med 22 602 Besætninger og ca. 306 000 Kreaturer. Desuden er en Del Mejerikredse, især paa Fyn, rensset uden anden Anvendelse af Statstøtte end vederlagsfri Ydelse af Tuberkulin.

De skiftende Nedslagningsordninger har som nævnt betydet en stor Støtte for Bekæmpelsesarbejdet. I Henhold til disse er der nedslaaet 11 321 reagerende Dyr i 1934, 35 209 Dyr i 1935, 66 681 Dyr i 1936, 18 864 Dyr i 1937, 39 226 Dyr i 1938, 31 838 Dyr i 1939 og 28 250 Dyr i 1940, ialt 231 389 reagerende Dyr. Samtidig er der rensset et meget stort Antal Besætninger, hvilket Antal man dog ikke kan gøre op for alle Aarene, men ifølge Kredsyrlægernes Indberetninger er der i 1936 ved Ordningens Hjælp rensset 8 500 Besætninger, i 1937 rensset 2 803 Besætninger, i 1938 rensset 4 936 Besætninger, i 1939 rensset 4 811 Besætninger og i 1940 rensset 4 820 Besætninger. I disse Tal er kun medregnet Besætninger, i hvilke Ordningen er benyttet til Nedslagning af de sidste reagerende Dyr, men ikke Besætninger, i hvilke de er udsat paa anden Maade. Det store Antal reagerende Dyr og rensede Besætninger i 1936 skyldes, at Afregningsprisen for reagerende Dyr i nævnte Aar gennemgaaende var ansat forholdsvis højt sammenlignet med Prisen i det aabne Marked.

Endvidere har virket stærkt fremskynende paa Bekæmpelsesarbejdet de af mange Mejerier vedtagne Arbejdsplaner, efter hvilke der betales mindre for Mælk fra reagerende Besætninger, samt forskellige Byers Krav om, at Konsummælken skal hidrøre fra tuberkulosefri Besætninger. De Købstadkommuner, der forlanger Konsummælken (nogle Steder dog kun den raa) leveret fra tuberkulosefri Kvægbesætninger, er for Tiden København, Hillerød, Frederikssund, Frederiksværk, Holbæk, Slagelse, Skelskør, Nakskov, Stubbekøbing, Odense, Nyborg, Middelfart, Rudkøbing, Aalborg, Nørre Sundby, Sæby, Holstebro, Lemvig, Løgstør, Varde, Vejle, Kolding, Aabenraa og Sønderborg.

Det vil af det oplyste fremgaa, at der er sat langt kraftigere ind mod Tuberkulosen paa Øerne end i største Delen af Jylland. Det maa i øvrigt bemærkes, naar henses til det meget store Antal udførte Tuberkulinprøver, at man ikke umiddelbart af de Oplysninger, som disse Prøver giver, kan slutte, at det angivne Antal tuberkulosefri Besætninger er Resultatet af en gennemført Bekæmpelse i Besætningerne. Dette er kun

Tilfældet i en vis Del af Besætningerne, medens de øvrige ikke har været inficerede ved Prøven, og der er derfor for disses Vedkommende kun sket en Konstatering af Tilstanden.

At slutte fra Resultatet af Tuberkulinprøverne til en stigende Rensning af Landet (bortset fra lokale Omraader) kan da heller ikke gennemføres, naar Statistikken fra Kødkontrollen betragtes. Denne Statistik viser langt fra noget opmuntrende Billede. Dette fremgaa af Bilag 2, der viser, at Tuberkuloseprocenten hos voksent Kvæg slagtet i Jylland endog nu ligger væsentligt højere end Gennemsnittet i Aarene 1915—1929, selv om den igen viser en kendelig nedadgaaende Tendens i Sammenligning med Aarene 1934—1938, hvor Tuberkuloseprocenten var ualmindelig høj. For Fedekalves Vedkommende viser der sig for Jylland en udtalt Stigning i Antallet af tuberkulose Dyr, ikke alene i Løbet af 1930erne, hvor en stærkere Udsættelse af reagerende Kalve kunde tænkes som Aarsag, men ogsaa i Aarene inden 1930, hvor der praktisk taget næsten ingen Tuberkulosebekæmpelse blev drevet i Jylland. For denne Landsdels Vedkommende, hvad der igen vil sige for omtrent $\frac{2}{3}$ af Landets Kvægbestand, ser det altsaa ud til, at Tuberkulosen har faaet en forøget Udbredelse i Løbet af de sidste ca. 20 Aar. For Øernes Vedkommende er der derimod ogsaa efter Slagte-tallene i de sidste Aar Tegn paa en Nedgang i Tuberkulosens Udbredelse, hvad angaar voksent Kvæg. For Fedekalves Vedkommende er der for Øerne i Aarenes Løb temmelig kraftige Svingninger, men Tendensen er her i de senere Aar ligeledes nedadgaaende. Hvad Svinetuberkulosen angaar, jfr. Bilag 3, kan der spores en mindre Nedgang. Om denne Nedgang hidrører fra nedsat Smitte fra Kvæg eller Fjerkræ, kan ikke afgøres, og Tallene for Svin slagtingerne har derfor kun en mindre Værdi til Bedømmelse af Kvægtuberkulosens Udbredelse. Det kan kun siges, at den overvejende Del af Smitten hidrører fra Kvæg. Som Forklaring paa, at der stadig findes saa mange tuberkulose Dyr ved Slagtingen, maa der henvises til, at der, bortset fra foran omtalte 65 Mejerikredse paa isoleret beliggende Øer og forskellige Mejerikredse paa Fyn, Lolland, Falster og Sjælland, selv i de Egne, hvor det største Arbejde er gjort for Tuberkulosens Bekæmpelse, stadig findes smittefarlige Kvægbesætninger, og at store Dele af Landet endnu kun i ringe Grad deltager i Bekæmpelsen. Som foran bemærket er der af de ca. 153 000 tuberkulinprøvede,