

risikoen ved universel *anæsthesi* i tandlægepraksis:

*Gwathmey* 1912 N<sub>2</sub>O 1 dødsfald på 5 000 000 (dental cases) (cit.: Sollmann, T.: A manuel of pharmacology 5th Edition S. 704).

*London dental hosp.*: Ingen letale tilf. på 1½ million dent. cases. (cit.: McKesson).

*Goldman*: Anesthesiology fra Eastman dental clinic, London: 59 123 cases in 10 years (1937—47), hvoraf 54 946 N<sub>2</sub>O—O<sub>2</sub>. The figures have been almost double since 1947 without any accidents; d. v. s. ca. 120 000 N<sub>2</sub>O uden uheld.

*Fr. Hewitt.* (Brit. dent. J.) 1909, 15. juni vol. 30.

Antal af medlemmernes N<sub>2</sub>O anæsthesier i B. B.: 1 345 000 uden letale tilfælde (1⅓ million).

*Samt hvad man kan udlede af Seldins brev: se uddrag ovenfor.*

Ingen dødsfald på over ½ million anæsthesier i løbet af de sidste 5 år, opgørelsen dækker.

Jeg har desværre ikke fået fat i nogen af redaktørerne for „Ugeskrift for Læger“, men regner med at „fat i professor Bonnevie i løbet af eftermiddagen.

Med venlig hilsen

H. Ruben.