

Lovforslaget fik under behandlingen i folketinget tilslutning fra alle sider. Det fandtes at indeholde berettigede skærpselser af lovgivningen mod smughandelen med de pågældende stoffer og mentes sammen med de tidligere nævnte lovforslag om ændringer i lægeloven og tandlægeloven at give gode muligheder for bekæmpelse af det stigende misbrug af euforiserende stoffer.

Udvalgsbehandlingen resulterede i den ovenfor omtalte ændring af lovforslagets § 1. Som bilag til udvalgets betænkning er optrykt en række af udvalget til ministeren stillede spørgsmål og disses besvarelse.

Lovforslaget vedtoges enstemmigt ved 3. behandling.

52. Lov om vaccination mod børnelammelse. (Indenrigs- og boligminister *Kjærboel*). [A. sp. 1915. — C. sp. 549].

FremSAT skriftligt i folketinget $14\frac{1}{4}$ (F. sp. 3622). 1. beh. $19\frac{1}{4}$ (F. sp. 3831). Partiernes ordførere: Kjældgaard, Givskov Christensen, Poul Claussen, Steen, Petra Petersen og Viggo Starcke. 2. beh. $21\frac{1}{4}$ (F. sp. 3976). 3. beh. $26\frac{1}{4}$ (F. sp. 4019). *Loven stadfæstet 24. maj 1955.* (Lovt. nr. 167).

Af ministerens fremsættelsestale og lovforslagets bemærkninger fremgår bl. a., at der siden begyndelsen af det 20. århundrede, da de første børnelammelsesepidemier optrådte her i landet, er sket en *førogelse i epidemiernes størrelse*, ligesom der er sket en ændring i fordelingen af tilfælde på aldersklasser. Mens i 1910 kun 5 pct. af de angrebne var over 15 år, har der under de sidste epidemier været ca. 30 pct. over 15 år, derunder navnlig sygelighed i aldersklasserne indtil 40 år. I sammenhæng hermed har sygdommen haft en langt alvorligere karakter og medført en betydelig dødelighed, især hos de voksne.

Tallene for de to sidste epidemier er følgende: i 1952: 2 450 tilfælde med lammelser, hvoraf ca. 400 med lammelse af åndedrætsmusklerne, og 262 døde, i 1953: 684 tilfælde med lammelser, hvoraf ca. 100 med lammelse af åndedrætsmusklerne, og 58 døde.

I USA gennemførtes i 1954 et stort anlagt *forsøg med børnelammelsesvaccine* omfattende 1,8 mill. børn i 44 forskellige stater; af disse børn blev 440 000 vaccineret 3 gange med en vaccine, der ganske svarer til den vaccine, som anvendes her i landet, og som fremstilles på statens seruminstitut. De øvrige børn i det amerikanske forsøg tjente som kontrolgruppe. Forsøget gav til resultat, at *vaccinen var 80—90 pct. effektiv; specielt for de sværeste tilfælde af polio* — var vaccinen ifølge rapporten i besiddelse af *en effektivitet på 94 pct.* Allerede samtidig med at det ameri-