

let tillader en gradsinddeling af høretabet i 3 grader, hvor grad 1 betegner let høretab, medens grad 2 og 3 betegner væsentligt høretab, større end 40 decibel.

Variationen af høretabets sværhedsgrad fremgår af tabel 4, hvor friske og forværede fyrværkeriskader er taget under ét.

Tabel 4. Ændring i høredefekterne opgjort i gradsinddeling efter 4-5 måneders observation for såvel friske som forværede skader (øreorganer). (Jfr. foreløbig opgørelse, tabel 2).

Undersøgel- sестidspunkt	Ialt beska- digeде ører	Beskadigede ører efter høredefekternes omfang		
		grad 1 25-35 db.	grad 2 40-55 db.	grad 3 60 db. og derover
Januar 1965	736	305	293	138
April-Maj 1965	472	196	207	69
Reduktion total	264	109	86	69
- pct.	35,9	35,7	29,0	50,0

Sammenholdes tabel 4 med tabel 2 i den foreløbige opgørelse, findes at antallet af beskadigede øreorganer er reduceret med 36 pct. For de beskadigede øreorganer finder man praktisk taget uforandret fordeling af sværhedsgraderne, idet høretab af grad 2 og grad 3 taget under ét findes blandt ca. 60 pct. af høreorganerne såvel straks efter nytår som 4-5 måneder senere.

2. Høreskader bestående, opstået alene efter tidligere nytårsfyrværkeri uden forværring januar 1965.

Disse er påvist hos i alt 155, d. v. s. 2,6 pct. af de 5.896 drenge. Af disse forekommer 94 énsidige og 61 dobbeltsidige tilfælde, hvis hørestatus ved afslutningen af undersøgelsen fremgår af tabel 5, hvor énsidige og dobbeltsidige høredefekter er opgjort hver for sig.

Tabel 5. Resultat af undersøgelse 4-5 måneder senere af tidligere fyrværkeriskader uden forværring i januar 1965.

	læsion på eet øre	helbredt	læsion på begge ører	helbredt begge ører	eet øre	Ialt hel- bredte drenge	Ialt drenge med læsion
Januar 1965	94	—	61	—	—	—	155
April-Maj 1965	85	13	53	—	7	13	138

Af tabel 5 fremgår, at der ved afslutning af undersøgelsen er konstateret normal hørelse på begge ører hos 8,6 pct., idet $\frac{1}{12}$ af drengene med énsidig høretab nu hører normalt, medens der blandt de 61 drenge med dobbeltsidig høredefekt ikke findes nogen, der er kommet til at høre normalt på begge ører.

Hos de resterende 138 drenge er der stadig nedsat hørelse. Sammenligning mellem undersøgelserne med 4-5 måneders mellemrum viser en udpræget tendens til et uforandret eller fremadskridende høretab, således, som det fremgår af tabel 6.