

berkulin, der skal prøves, med standardtuberkulinet; resultatet skal udtrykkes i internationale enheder per ml.

b) Styrkebestemmelse på kvæg:

Såfremt afprøvningen foretages på kvæg, skal de reaktioner, der opnås på tuberkulose kreaturer med det tuberkulin, der skal kontrolleres, være identiske med de reaktioner, som samme dosis standardtuberkulin fremkalder.

19. Tuberkulinprøven skal alene foregå ved intrakutan indsprøjtning enten på halsen eller på skulderen.

20. Den dosis tuberkulin, der skal indsprøj-

tes, skal være på 5.000 I.E. PPD eller syntetisk tuberkulin.

21. Resultatet af intradermaltuberkulinprøven skal aflæses efter 72 timer og bedømmes i henhold til nedenfor anførte metode:

a) Negativ reaktion, hvis man kun bemærker en lokal hævelse med en forøgelse af hudens tykkelse på ikke over 2 mm, uden kliniske tegn som dejagtig konsistens, eksudation, nekrose, smerte eller betændelsesreaktion i regionale lymfekar og lymfekirtler.

b) Positiv reaktion hvis man bemærker kliniske tegn som de, der er nævnt i afsnit a) eller en forøgelse af hudens tykkelse på over 2 mm.