

Bilag 4.

Abortus Provocatus Legalis 8 års materiale fra Esbjerg Centralsygehus kirurgisk afdeling.

Af Thorkild Espersen.

Det er fundet af interesse at opgøre nævnte materiale med henblik på antallet af abortive indgreb, klienternes aldersfordeling, graviditetsalder samt foretage en vurdering af de enkelte anvendte abortive metoder og deres komplikationer.

Endvidere er der foretaget en sammenlignende undersøgelse af de abortive indgreb foretaget på afdelingen et år før, henholdsvis et år efter den nye abortlov trådte i kraft 1. april 1970.

Materiale.

I perioden 1. april 1964-31. marts 1972 er der på kirurgisk afdeling, Esbjerg Centralsygehus registreret 911 indgreb med henblik på abortus provocatus legalis, alle med indstilling fra Mødrehjælpsinstitutionen for Ribe amt. Heraf er 873 tilfælde nærmere undersøgt. I materialet indgår ikke tilfælde, hvor der er foretaget abortindgreb på medicinsk indikation.

Fordelingen af antallet af patienter på de enkelte årgange fremgår af figur 1.

Graviditetsalderens fordeling i materialet fremgår af figur 2. Graviditetens alder er blevet bestemt ud fra følgende kriterier: menstruationsanamnese, uterus størrelse bedømt ved explorationsfundet umiddelbart før indgrebet, samt bedømmelse af det udtømte graviditetsprodukt.

Metoder.

Indtil 31. marts 1970 var de anvendte metoder:

1. Stipes laminariae et evacuatio uteri i universel anæsthesi. Har været standardmetode ved graviditeter under 12-13 uge.

Indlæggelsestiden i ukomplicerede tilfælde 3 dage.

2. Instillatio NaCl extraovulært efterfulgt af pitupartinkur, senere evacuatio uteri i universel anæsthesi. Anvendt til graviditeter over 12-13 uge. Indlæggelsestiden har i de ukomplicerede tilfælde gennemsnitlig været 4-5 dage.

3. Hysterotomia abdominalis (sectio caesarea parva). Indgrebet har været anvendt, hvor der samtidig skulle foretages sterilisationsoperation. Indlæggelsestiden har normalt været 7 dage.

Efter 1. april 1970 er der desuden anvendt:

4. Dilatatio canalis cervicis et expiratio vacuo uteri i universel anæsthesi, og (sugemetoden) det samme indgreb blot foretaget i lokal anæsthesi (paracervicalt). Indlæggelsestiden ved anvendelse af sugemetoden har kun været anvendt til graviditeter under 12-13 uge.

Komplikationer.

Samtlige tilfælde, hvor der har været bemærket afvigelser fra det normale forløb, er medtaget. I tvivlstilfælde er der taget hensyn til indlæggelsestiden.

Der er tale om de umiddelbare komplikationer, opstået i direkte relation til indgrebet eller i de næste døgn, idet patienter med komplikationer indtrædende efter udskrivelsen ikke er medtaget.

Komplikationerne er registrerede i henhold til Sundhedsstyrelsens formular nr. 4910 om anvendelse af abortus provocatus.

1. Blødning mere end sædvanlig dog ikke medførende re-evacuatio eller transfusion.