

Resume.

Abortus provocatus legalis 8 års materiale fra Esbjerg Centralsygehus kirurgisk afdeling.

af Thorkild Espersen.

Der redegøres for et 8 års materiale af legale abortive indgreb i tiden 1. april 1964—1. april 1972.

873 tilfælde er undersøgt med henblik på kvindens og graviditetens alder ved indgrebet. Hvilke abortive metoder, der har været anvendt og de registrerede komplikationer, som optræder i relation til indgrebet.

I gennemsnit er der fundet en komplikationsfrekvens på 10,4 pct.

Jo yngre kvinden er ved det abortive indgreb, desto højere er komplikationsfrekvensen.

Komplikationsfrekvensen er stigende ved stigende graviditetsalder, og som også tidligere undersøgelser har vist, er der fundet en betydelig forskel på komplikationsfrekvensen på tiden før og efter 12. svangerskabsuge.

Af alvorligere komplikationer kan nævnes, at man ud af 873 tilfælde 2 gange har haft perforation af uterus med efterfølgende akut laparotomi og tarmresection.

Af de anvendte metoder har man fundet den såkaldte „sugemethode“ (expiratio vacuo uteri i universel eller lokal anæsthesi) som den skånsomste.

Installationsmetoden, som kun er anvendt i få tilfælde, er behæftet med for høj en komplikationsfrekvens til fortsat at kunne anvendes.

Som ventet har undersøgelsen vist en betydelig stigning (129 pct.) af antallet af abortsøgende kvinder før og efter sidste revision af abortloven 1. april 1970. En stigning,

der først og fremmest skyldes de helt unge og de ældre kvinders lettere adgang til legal abort.

Litteraturliste

- 1: Lauritsen, J. Glenn. og Haack-Sørensen, P.H.: Ugeskr. Læg. 1972: 143: 405-409.
- 2: Lebech, D.E. og Nielsen, H.B.: Ugeskr. Læg. 1967: 129: 1356-1366.
- 3: Olsen, C.E. og Nielsen, H. Borch og Østergaard, E.: Ugeskr. Læg. 1967: 129: 1341-1351.
- 4: Sood, S.V., British Medical Journal 1971: 4: 270-273.

Tabel I. Metoder, antal udførte indgreb, komplikationer i antal og i procent.

Metode	Antal	Kompliserede	
		tilfælde	%
Stipes laminariae et evacuatio uteri . . .	489	55	11,2
Installatio NaCl . . .	21	17	4,5
Expiratio vacuo uteri i universel anæsthesi	31	4	
Expiratio vacuo uteri i lokal anæsthesi . .	155	7	4,5
Samlet	873	91	10,4

Tabel III. Komplikationsfrekvens (i %) i relation til kvindens alder.

Kvindens alder i år.	Antal patienter	Kompliserede tilfælde	i %
20	148	23	15,5
21-35	491	49	9,9
36	234	19	8,1

Tabel II. Komplikationsfrekvens i procent i relation til graviditetsalder (alle abortmetoder).

Graviditetsalder i uger	<8	9-10	11-12	13-14	15-16	> 17
Antal aborter	153	250	301	101	48	20
Kompliserede tilfælde	5	15	28	20	17	6
pct.	3,2	6,0	9,3	19,8	35,4	30,0