

[Landbrugsministeren]

Bilag 1

Gennemsnitsresultater ved konsummælkbedømmelserne på Statens Forsøgsmejeri.

		1971-72	1972-73	1973-74	1974-75*	1975-76	1976-77	1977-78
Sødmælk	A	12,95	13,21	13,11	12,80	12,93	12,95	12,87
	B	12,05	12,43	12,54	12,11	12,40	12,65	12,45
Letmælk	A	—	13,00	12,99	12,52	12,76	12,76	12,77
	B	—	12,15	12,27	11,82	12,17	12,47	12,39
Skm.mælk	A	12,09	12,32	12,33	12,54	12,63	12,60	12,42
	B	10,89	11,24	11,48	11,57	11,71	12,14	11,70
Fløde 2	A	9,88	9,88	9,83	10,14	10,47	10,80	10,31
	B	8,42	8,33	8,41	8,90	9,19	9,92	9,20
Piskefløde	A	11,06	11,42	11,71	11,00	11,12	11,37	10,42
	B	9,44	9,94	10,36	9,74	9,90	10,56	9,29
Kærnemælk	A	8,56	8,88	9,02	8,99	9,20	9,83	9,80
	B	7,89	8,37	8,49	8,52	8,80	9,47	9,24
Tykmælk	A	9,29	9,67	10,45	10,38	10,40	10,01	10,00
	B	8,77	9,46	10,18	10,18	10,20	9,78	9,70
Ymer	A	9,19	9,53	10,25	10,15	10,26	9,75	9,90
	B	8,41	9,01	9,81	9,70	9,96	9,37	9,40
Yoghurt med jordbær		9,98	10,45	10,94	11,08	10,99	11,03	11,18
		9,43	10,13	10,59	10,71	10,70	10,68	10,71

* Belastningen af prøverne forud for bedømmelserne blev ændret fra 5-7 døgn v. 5° C.

A - Hovedkarakter.

B - Hovedkarakter korrigeret for bakteriologisk beskaffenhed.

Bilag 2

Resultater af hygiejnisk-bakteriologiske undersøgelser (veterinærdirektoratets årsrapporter).

		sødmælk % af 100	letmælk % af 100	skm.mælk høj.past.	fløde % af 100
Kimalt ≤ 1.000	1974	46,2	48,6	80,0	80,4
	1976	53,7	57,7	83,9	83,3
	1977	59,2	62,4	90,5	87,9
Coli ≤ 10	1974	98,2	97,7	95,1	91,3
	1976	98,0	97,8	96,3	93,4
	1977	98,7	98,8	97,7	96,5
Holdbarhedsprøver Red. > 4,5 time	1974	89,5	89,9	88,3	71,8
	1976	91,9	93,5	92,3	77,1
	1977	95,3	96,1	94,8	83,8