

## Redegørelse vedrørende grindefangst på Færøerne

### 1. Grindefangstens betydning

Fangsten af grindehval på Færøerne har stærke traditioner. Fangsten og spisningen af kød og spæk er en integreret del af færøsk folkekultur. Grindefangsten har altid leveret

et meget stort bidrag til kødforsyningen på øerne, der fra naturens hånd har meget dårlige vilkår for madvareproduktion på landjorden. I 1984 har produktionen af kød på Færøerne været omtrent således:

Fåre- og lammekød . . . . .	500 tons
Okse- og kalvekød . . . . .	110 tons
Søfugle . . . . .	30 tons
Svinekød, hønsekød . . . . .	10 tons
I alt produktion på landjorden . . . . .	700 tons
Grindehvaler, 1.921 hvaler à 0,4 tons . . . . .	750 tons
Finhvaler, 2 hvaler à ca. 7,5 tons . . . . .	15 tons
I alt . . . . .	1.465 tons

Grindefangsten udgjorde således i 1984 mere end halvdelen af den samlede kødproduktion og ca. ¼ af den samlede kødforsyning.

### 2. Grindefangstens biologiske aspekter

Det har ikke hidtil været forsøgt at foretage et estimat af den samlede bestand af grindehvaler i Nordatlanten.

Det er almindeligt bekendt, at grindehvaler forekommer hyppigt i større flokke overalt i Nordatlanten, lige fra Barentshavet i nordøst til Newfoundland i sydvest.

Der skydes grindehvaler flere steder, men det eneste sted, hvor der i dag fanges grindehvaler i større omfang, er på Færøerne.

Det er kun flokke, der kommer nærmere land end ca. 10–12 sømil, der kan blive genstand for fangst.

Statistikken over de færøske grindefangster eksisterer fra 1584 og til i dag, dog bortset fra perioden 1640–1709. Statistikken viser betydelige udsving i de årlige fangster. Disse udsving tilskrives ikke ændringer i bestanden, men i vandringsmønstret, der påvirkes af forekomsterne af grindehvalernes foretrukne fødeemne: blæksprutter.

Fangsterne i de sidste 10 år har været følgende:

1975: 1.080 . . . . .	1980: 2.773
1976: 531 . . . . .	1981: 2.973
1977: 878 . . . . .	1982: 2.262
1978: 1.238 . . . . .	1983: 1.689
1979: 1.725 . . . . .	1984: 1.921

Gennemsnitsfangsten i de sidste 10 år har været 1.709 hvaler.

Den færøske fangst er så lille sammenholdt med den skønnede samlede bestand, at den ikke nævneværdigt påvirker bestandens størrelse eller vækstrate.

I øvrigt er fangsttallene for 1982–84 mindre end den potentielle fangst, idet adskillige hvalflokke i denne periode er blevet drevet til havs igen, idet fangsten i et distrikt standses, når myndighederne skønner, at distriktets forsyning med grindekød er tilstrækkelig.

Medens der ikke på kort sigt synes at være nogen fare for bestanden, er det muligt, at grindehvalen på længere sigt er truet af andre farer end jagten.

Grindehvalen er som rovdyr temmelig højt placeret i den marine fødekæde. Den er der-