

Svar (27/7 93):

Sundhedsministeren (Torben Lund):

Jeg har indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, der har oplyst følgende:

»Der findes ingen registrering i Sundhedsstyrelsen af, hvor mange stofmisbrugere der de sidste 10 år er døde som følge af metadonoverdosis. Der kan imidlertid henvises til Sundhedsstyrelsens publikation »Alkohol- og narkotikamisbruget 1990-1991«, p. 74, hvor forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Danmark nærmere er omtalt.«

Idet jeg vedlægger de omtalte sider af Sundhedsstyrelsens publikation (ikke optrykt her), kan jeg henholde mig til det af Sundhedsstyrelsen udtalte.

Spm. nr. S 1202

Til *sundhedsministeren* (22/7 93) af:

Jan Køpke Christensen (FP):

»Vil ministeren på baggrund af de oplysninger, der er fremkommet i JyskeVestkysten den 21. juli 1993 om praktiserende lægers ordination af metadon til stofmisbrugere, samt de oplysninger, der er fremkommet i Morgenavisen Jyllands-Posten den 21. juli 1993 om praktiserende lægers ordination af smertestillende og stærkt vanedannende morfinpræparater, iværksætte en landsdækkende undersøgelse, der kan belyse, hvordan de praktiserende læger landet over håndterer ordination af metadon til stofmisbrugere samt ordination af morfinpræparater og lignende til patienter med stærke smerter?«

Begrundelse

JyskeVestkysten oplyste den 21. juli 1993, at Retsmedicinsk Institut i Odense har påvist, at to ud af syv narkodødsfald i Sønderjylland i 1989-91 skyldtes metadonforgiftning, hvilket angiveligt skyldes, at der handles med overskydende metadon.

Morgenavisen Jyllands-Posten oplyser den 21. juli 1993, at det ofte forekommer, at patienter med forholdsvis uproblematisk lidelse som menstruationssmerter og ondt i ryggen har fået ordineret smertestillende morfinpræparater, og at denne behandling er fortsat lang tid efter, at de egentlige smerter har fortaget sig, fordi patienterne har vænnet sig til at tage morfin.

Svar (27/7 93):

Sundhedsministeren (Torben Lund):

Jeg har indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, der har oplyst følgende:

»Sundhedsstyrelsen og embedslægeinstitutionerne har denne sommer taget et nyt edb-overvågningssystem i brug med henblik på at effektivisere overvågningen af lægernes ordination af afhængighedsskabende medicin, herunder metadon. Oplysningerne om stedfundne ordinationer indberettes fra alle landets apoteker og giver embedslægeinstitutionerne et dækkende billede af den enkelte læges ordinationspraksis samt mulighed for at gribe ind, såfremt denne ikke findes tilfredsstillende.«

Jeg kan henholde mig til det af Sundhedsstyrelsen udtalte.

Spm. nr. S 1203

Til *sundhedsministeren* (22/7 93) af:

Jan Køpke Christensen (FP):

»Hvad kan ministeren oplyse om de praktiserende lægers ordination af stærkt vanedannende medicin og metadon?«

Begrundelse

Flere medier, bl.a. JyskeVestkysten den 21. juli 1993, oplyser, at det regelmæssigt forekommer, at praktiserende læger ordinerer for meget metadon til stofmisbrugere. Der findes mange eksempler på, at metadon, der er overordnet, har skadelige konsekvenser f.eks. i form af videresalg og dødsfald på grund af overdosis af metadon.

Morgenavisen Jyllands-Posten oplyser den 21. juli 1993, at det ofte forekommer, at patienter med forholdsvis uproblematisk lidelse som menstruationssmerter og ondt i ryggen har fået ordineret smertestillende morfinpræparater, og at denne behandling er fortsat lang tid efter, at de egentlige smerter har fortaget sig, fordi patienterne har vænnet sig til at tage morfin.

Såfremt det er korrekt, at det jævnligt forekommer, at praktiserende læger ordinerer for meget metadon til stofmisbrugere, er det indlysende, at der er tale om fejlagtig praksis på området, og der må derfor tages initiativer til ændringer.