

sådan varighed, at eleverne får den nødvendige tid til at indtage mad og drikke. Den samlede daglige tid til frikvarterer, herunder spisepausen, skal udgøre 10 minutter for hver fulde 45 minutters undervisning, sidste time medregnet samt yderligere 10 eller 15 minutter. Der var således ikke konkrete krav til spisepausens længde.

Ministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om frikvarterer og spisepauser blev ophævet ved lov nr. 435 af 13. juni 1990, hvorefter det er overladt til lokal afgørelse at fastsætte nærmere rammer og retningslinjer herfor.

Spm. nr. S 1117

Til sundhedsministeren (12/1 01) af:
Gyda Kongsted (V):

»Vil ministeren nærmere redegøre for udviklingen i astma og allergi for børn og unge inden for aldersgrupperne 0-3, 3-7, 7-12 og 12-16 og basere oplysningerne på de sidste 45 år?«

Svar (25/1 01)

Sundhedsministeren (Arne Rolighed):

Der foreligger ikke oplysninger, der kan belyse udviklingen inden for de sidste 45 år i astma- og allergi for børn og unge i forskellige aldersgrupper.

Jeg kan imidlertid henvise til publikationen »Børns sundhed i Danmark« udgivet af DIKE (Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi) i 1998, der bl.a. i kapitel 5, afsnit 5 indeholder en række oplysninger om forekomsten af allergiske sygdomme de seneste 30 år.

Jeg har sendt et eksemplar af den pågældende publikation til spørgeren.

Spm. nr. S 1118

Til sundhedsministeren (12/1 01) af:

Gyda Kongsted (V):

»Vil ministeren nærmere redegøre for udviklingen i mellemørebetændelser hos børn og unge i

de sidste 35 år inden for aldersgrupperne 0-3, 3-7, 7-12 og 12-16 år samt herunder oplyse, hvor mange der i de respektive aldersgrupper tillige har fået indlagt dræn?«

Begrundelse

Det findes beklageligt og betænkeligt at have konstateret, at mellemørebetændelse er meget udbredt blandt børn i vuggestuer. Denne tendens er meget uønskelig og eventuelle forebyggelsesmuligheder må derfor undersøges.

Svar (25/1 01)

Sundhedsministeren (Arne Rolighed):

Der foreligger ikke oplysninger, der kan belyse udviklingen i de sidste 35 år i mellemørebetændelser hos børn og unge inden for forskellige aldersgrupper, herunder hvor mange der har fået indlagt dræn.

Jeg kan imidlertid henvise til publikationen »Børns sundhed i Danmark« udgivet af DIKE (Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi) i 1998, der bl.a. i kapitlerne 3 og 4 indeholder visse oplysninger om forekomsten af mellemørebetændelser.

Som oplyst i min besvarelse af spørgsmål S 1117 har jeg sendt et eksemplar af den pågældende publikation til spørgeren.

Spm. nr. S 1119

Til sundhedsministeren (12/1 01) af:

Gyda Kongsted (V):

»Vil ministeren nærmere redegøre for den kommunale sundhedssektors aktive indsats og påpejning af sundhedsskadelige faktorer, herunder indeklima m.v. i vuggestuer, daginstitutioner og skoler, og hvorvidt der ydes den ønskede aktive indsats, samt hvorvidt der er kommuner, der måtte have ubesatte stillinger i den kommunale sundhedssektor, således at den forebyggende helbredsindsats ikke kan finde sted?«