

**Spm. nr. S 2191**

Til sundhedsministeren (21/3 01) af:

**Gyda Kongsted (V):**

»Vil ministeren redegøre for, hvilke transportmuligheder en fysisk handicappet person har for at komme fra eget hjem til fysioterapi på et sygehus?«

**Begrundelse**

Det har vist sig, at handicappede uden egen bil ikke har mulighed for at bruge bl.a. HT's handicap service, idet denne kun kører til fritidsformål.

**Svar (3/4 01)**

**Sundhedsministeren (Arne Rolighed):**

I henhold til reglerne i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1176 af 21. december 1995 om ydelse af befordring eller befordringsgodtgørelse i henhold til lov om sygehusvæsenet og lov om svangerskabshygiejne og fødeselshjælp med senere ændring ydes der befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj, herunder særlig kørestolsvogn, hvis den pågældendes tilstand nødvendiggør sådan befordring.

Der ydes endvidere befordring eller befordringsgodtgørelse til førtids- og folkepensionister.

Ligeledes ydes der befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus indkaldes til ambulans behandling, og hvis tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler som bus, tog eller færg.

Det bemærkes, at det i alle tilfælde beror på en lægelig vurdering, hvorvidt en person opfylder de ovennævnte helbreds-kriterier for befordring eller befordringsgodtgørelse. Det er endvidere op til amtskommunen at beslutte, hvorvidt der i de konkrete tilfælde tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

**Spm. nr. S 2262**

Til sundhedsministeren (27/3 01) af:

**Gyda Kongsted (V):**

»Vil ministeren redegøre for, hvorvidt der er foretaget videnskabelige undersøgelser, der påviser, at børn, der dagligt udsættes for tobaksrøg, har 50 pct. hyppigere mellemørebetændelse, end børn der ikke dagligt er udsat for tobaksrøg?«

**Begrundelse**

I debatten i BT torsdag den 22. marts 2001 fremgår det under overskriften, »Jeg er chokeret over Henrik og Margrethe«, at der er en sammenhæng mellem mellemørebetændelse og tobaksrøg. Mere konkret fremgår det, at børn, der dagligt udsættes for tobaksrøg, har 50 pct. hyppigere mellemørebetændelse, end børn der ikke dagligt er udsat for tobaksrøg.

**Svar (4/4 01)**

**Sundhedsministeren (Arne Rolighed):**

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet følgende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, hvortil jeg skal henholde mig:

»Ved en litteratursøgning i Medline fremkommer ca. 700 artikler omhandlende passiv rygning og børn. En række af disse artikler omhandler mellemørebetændelse. Imidlertid findes to grundige meta-analyser, der specifikt har gennemgået videnskabelige undersøgelser mellem eksposition for passiv rygning og udvikling af mellemørebetændelse. Sundhedsstyrelsen har i nærværende svar anvendt disse to meta-analyser til at besvare spørgsmålet om den mulige øgede risiko for at udvikle mellemørebetændelse hos børn, når en eller begge forældre ryger i hjemmet.

Den ene gennemgang (Uhari M, Mantysaari K, Niemela M. A meta-analytic re-view of the risk factors for acute otitis media. Clin Infect Dis 1996; 22: 1079-83) har i perioden 1966 til 1994 fundet 61 undersøgelser, hvoraf de 22 havde en kvalitet, der gjorde dem anvendelige til en meta-analyse. Der er undersøgt for faktorer, der har betydning for udvikling af akut mellemørebetændelse hos børn. Hovedresultatet er: