

I sit svar oplyser ministeren blandt andet, at der »kun« har været fire selvmord blandt unge under 20 år i de sidste ti år. Set i lyset af de senest omtalte selvmordsforsøg på baggrund af milde smertestillende piller blandt børn, som omtalt i TV-nyhederne på TV 2-Øst mandag den 24. november 2003 og i Ekstra Bladets artikel den 26. november 2003, mener spørgeren, at det er vigtigt ikke alene at tage højde for selvmord, men også for selvmordsforsøg. Den massive indtagelse af blandt andet Panodil – som det sker i forbindelse med et selvmordsforsøg – kan medføre alvorlige forgiftninger og varige skader på lever, nyre m.v. Også selv om det lykkes at redde selvmordskandidatens liv.

I den forbindelse mener spørgeren også, det mildest talt er bekymrende, at Lægemiddelstyrelsen i sin afgørelse ikke tager antallet af selvmordsforsøg i betragtning, der resulterer i alvorlige forgiftninger.

Svar (18/12 03)

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet oplysninger fra Sundhedsstyrelsen.

På baggrund heraf kan det oplyses, at der ikke findes nogen landsdækkende opgørelse, der belyser antallet af og udviklingen i selvmordsforsøg blandt børn og unge under 20 år de seneste 10 år. Der findes derfor ikke nogen faktisk viden om, hvordan udviklingen har været på landsplan, herunder i hvilket omfang selvmordsforsøg blandt unge skyldes forgiftning med lægemidler indeholdende paracetamol eller acetylsalicylsyre, som er de lægemidler, der er omfattet af begrebet »svage smertestillende lægemidler«. Derimod vides det ud fra tal oplyst af Lægemiddelstyrelsen, at der i perioden 1994 – 2003, i opgørelse fra Rigshospitalet, har været i alt 4 selvmord blandt unge under 20 år begået med svage smertestillende lægemidler.

Sundhedsstyrelsen har fra Center for Selvmordsforskning modtaget oplysninger, som centeret har opsamlet om antallet af selvmordsfølgshændelser i aldersgruppen 15-19 år for et enkelt amt, Fyns Amt.

	Antal forsøg Mænd	Metode X60	Antal forsøg Kvinder	Metode X60
1990	22	27,3%	25	40,0%
1991	16	12,5%	37	37,8%
1992	15	26,7%	28	32,1%
1993	28	21,4%	33	51,5%
1994	14	35,7%	52	53,8%
1995	20	10,0%	51	58,8%
1996	10	20,0%	42	54,8%
1997	14	28,6%	49	57,1%
1998	17	52,9%	57	68,4%
1999	9	44,4%	47	55,3%
2000	16	25,0%	66	56,1%
2001	19	47,4%	58	50,0%

Tallene dækker alle selvmordsforsøg, der har ført til kontakt til sundhedsvæsenet, uanset metode. Af oplysningerne fra Center for Selvmordsforskning fremgår, at der for hvert forsøg statistisk registreres op til 3 metoder. Et enkelt forsøg kan således være registreret med f.eks. både forgiftning med lægemidler, hængning og

snit i håndledet som metode. Hver metode inddeles efter ICD 10-klassifikationen.

I den ovenfor anførte tabel er angivet en procentvis opgørelse af, hvor stor en andel af selvmordsfølgene, der som én af de 3 metoder har metode X 60. Denne metode omfatter følgende præparatyper: