

- Paracetamol
  - Acetylsalicylsyre
  - Dextropropoxyphen (f.eks. præparatet Abalgin)
  - NSAID (Non-steroidale antiinflammatoriske farmaka, dvs. præparater, der anvendes ved reumatiske lidelser)
- Heraf indgår som nævnt de to første i gruppen af »svage smertestillende lægemidler«.

Metoden omfatter ikke codein og migrænemidler.

Der findes ikke oplysninger om fordelingen af forsøg forårsaget ved anvendelse af de enkelte af de præparatgrupper, der indgår i metode X60. Det er således ikke muligt ud fra disse tal at sige noget om, hvor stor en del af de opgjorte forsøg med metode X60, der skyldes forgiftning med svage smertestillende lægemidler, herunder hvorledes udviklingen har været i den opgjorte periode.

Tallene viser, at der fra 1990 til 2001 har været tale om et nogenlunde uændret niveau i antal registrerede selvmordsforsøgshændelser blandt mænd i aldersgruppen 15-19 år i Fyns Amt på omkring 20. Det fremgår dog samtidig, at antallet af selvmordsforsøgshændelser har varieret ganske betydeligt over den opgjorte periode med yderpunkter i 1993 på 28 og 1999 på 9.

Ses der på antallet af selvmordsforsøgshændelser blandt kvinder i den samme aldersgruppe i Fyns Amt fremgår det, at der har været tale om en stigning i antallet fra 25 i 1990 til 58 i 2001. Det fremgår ligeledes, at der også her har været betydelige udsving i såvel opadgående som nedadgående retning i de årlige registreringer i den opgjorte periode.

Der er i de foreliggende tal tilsyneladende ikke nogen entydig sammenhæng mellem stigninger og fald i det totale antal selvmordsforsøgshændelser og andelen af forsøg, der er registreret med metode X60.

Det fremgår af oplysningerne fra Center for Selvmordsforskning, at årsagen til stigningen i forsøgsraten for kvinder ikke er fundet, og at centeret for tiden arbejder på et forskningsprojekt, hvorfra det forventes at få resultater, som er i stand til at forklare dele af stigningen.

I begrundelsen for spørgsmålet er det bl.a. anført, at forgiftning med Panodil m.v. kan medføre varige skader på lever, nyre m.v., også selvom det lykkes at redde patientens liv. Lægemedelstyrelsen har som kommentar hertil oplyst, at Rigshospitalets Hepatologiske Klinik har afkræftet dette. Det er således ifølge disse oplys-

ninger helt exceptionelt, at der sker varige skader ved en sådan forgiftning. De reddede patienter vil i stort set alle tilfælde få en helt normal lever- og nyrefunktion.

For så vidt angår bemærkningerne i begrundelsen for spørgsmålet om, at Lægemedelstyrelsen ikke har taget antallet af selvmord i betragtning har Lægemedelstyrelsen oplyst, at Lægemedelstyrelsens samlede vurdering har været, at intet tyder på, at der til trods for et stigende antal selvmordsforsøg er et stigende antal fuldbyrdede selvmord, hvorfor det blev vurderet, at indførelse af receptpligt for store pakninger af svage smertestillende lægemidler ikke var hensigtsmæssigt. Sundhedsstyrelsen har i deres anbefaling kunnet tiltræde dette.

### Spm. nr. S 1031

Til indenrigs- og sundhedsministeren (1/12 03) af:

**Tove Videbæk (KD):**

»Vil ministeren i henhold til TV-nyhederne på TV2-Øst mandag den 24. november 2003 og Ekstra Bladets artikel den 26. november 2003, om en række børn under 15 år som har forsøgt selvmord med milde smertestillende piller, revurdere sin beslutning om at fastholde de nuværende udleveringsbestemmelser?«

### Begrundelse

Spørgsmålet er en opfølgning på ministerens besvarelse af 25. november 2003 på spørgsmål nr. S 294 vedrørende håndkøbsmedicin som selvmordsredskab.

Ministeren henholder sig i sit svar til Lægemedelstyrelsens oplysninger om, at man ikke kan opnå en sikkerhedsmæssig fordel af at gøre de store pakninger receptpligtige. Disse oplysninger er ikke i tråd med »Handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark« fra 1998. Her er anbefalingen, at der sættes et maksimum for mængden af smertestillende midler i håndkøb. I planen står der desuden, at udenlandske undersøgelser viser, at mindskning af tilgængelighed af en metode ikke bare fører til, at metoden afløses af en anden.

Ministeren henviser i sit svar til Lægemedelstyrelsens vurdering, der blandt andet hviler på