

knoglebrud i ældrebefolkningen. Der er ingen alvorlig bivirkning ved at tage kalktilskud. Den hyppigste bivirkning er forstoppelse, som ofte aftager efter nogen tids behandling.

Motion er en meget vigtig faktor i forebyggelsen af knogleskørhed. Sundhedsstyrelsen udgav i 2003 rapporten »Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling«, som blev udsendt til alle landets praktiserende læger. Den indeholder blandt andet en gennemgang af dokumentationen for effekten af fysisk aktivitet på knoglebrud samt konkrete anbefalinger vedrørende hvilke type og mængde motion lægen kan anbefale til patienter med knogleskørhed og andre, der ønsker at forebygge sygdommen.«

Jeg kan henholde mig til det af Sundhedsstyrelsens oplyste. Endvidere kan jeg oplyse, at knogleskørhed er en af de 8 folkesygdomme, som regeringen satte fokus på i sundhedsprogrammet »Sund hele livet« fra 2002. Som opfølgning herpå er der nu iværksat et strategiarbejde vedrørende de 8 folkesygdomme bl.a. i samarbejde med en række patientorganisationer på områderne. Konkret omkring knogleskørhed har ministeriet i samarbejde med Osteoporoseforeningen fx igangsat et forsøg med en osteoporoserygskole, hvis formål det er at øge patienternes livskvalitet gennem at give dem en øget viden om knogleskørhed samt vejledning og bedre færdigheder i at leve med sygdommen.

Spm. nr. S 1842

Til indenrigs- og sundhedsministeren (28/1 04) af:

Tove Videbæk (KD):

»Vil ministeren kommentere artiklen »Poppers bør forbydes« bragt i tidsskriftet Farmaceuten, nr. 1, januar 2004?«

Begrundelse

Poppers er den populære betegnelse for stofferne amylnitrit, isopentylnitrit og isobutylnitrit. Stofferne har tidligere været registreret som lægemidler til behandling af angina pectoris, dvs. hjertekrampe, men benyttes ikke længere til dette formål. Stofferne er blevet erstattet af nitroglycerin og bypassoperationer. I dag sælges stoffet i stedet helt legalt i ubegrænsede mængder

og uden nogen form for faglig vejledning som sexstimulerende stof på internettet og i porno-butikker over hele landet.

Denne handel mener lektor ved Farmakologisk Institut, Sven Edelfors, at der skal sættes en stopper for, fordi der er en vis sundhedsmæssig risiko forbundet med at benytte stofferne – blandt andet fordi det er meget vanskeligt at dosere stofferne præcist. Ved forkert anvendelse kan de give hovedpine, hjertebanken, svimmelhed og pludselig, kortvarig besvimelse, kvalme, opkastning, forvirring og mated. En overdosering af stoffet kan medføre et kraftigt blodtab, og dermed er der risiko for, at der tilføres for lidt ilt til hjernen. Sker dette for mange gange, kan det medføre Parkinsons syge.

Svar (9/2 04)

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Jeg har i dag udstedt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer, som indebærer, at de såkaldte »poppers«, der omfatter stofferne amylnitrit (alle isomerer af amylgruppen, herunder isopentylnitrit) og isobutylnitrit, fra og med den 18. februar 2004 kun må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Om baggrunden herfor kan jeg i det hele henviser til det brev, hvormed jeg i dag har orienteret Folketingets Sundhedsudvalg om sagen.

Spm. nr. S 1911

Til socialministeren (30/1 04) af:

Tove Videbæk (KD):

»Vil ministeren kommentere brev fra Ældresagen af 28. januar 2004 vedrørende hjemmehjælp, særligt med hensyn til problemet med »kontinuitet og sammenhæng i hjælpen«?«

Begrundelse

Ældresagen har 28. januar 2004 sendt et brev til ministerier og folketingsmedlemmer, hvor foreringen beskriver en interviewundersøgelse blandt ældre, som den selv har gennemført. Undersøgelsens resultater kalder ifølge Ældresagen