

CO₂-udledningsfaktorer for 1998 til 2004 angivet i forhold til nedre brændværdi

| Brændsel | CO ₂ , kg/GJ |
|----------------------|-------------------------|
| Kul | 95,0 |
| Raffinaderigas | 56,9 |
| LPG | 65,0 |
| LVN | 65,0 |
| Motorbenzin | 73,0 |
| Flyvebenzin | 73,0 |
| Petroleum | 72,0 |
| JPI | 72,0 |
| Gas-/dieselolie | 74,0 |
| Fuelolie | 78,0 |
| Orimulsion | 80,0 |
| Petroleumskoks | 92,0 |
| Spildolie | 78,0 |
| Naturgas | 56,9* |
| Koks | 105,0 |
| Brunkulsbriketter | 97,0 |
| Bygas | 56,9 |
| Halm | 0,0 |
| Skovflis | 0,0 |
| Brænde | 0,0 |
| Træpiller | 0,0 |
| Træaffald | 0,0 |
| Biogas | 0,0 |
| Flydende biobrændsel | 0,0 |
| Affald | 78,7** |

* For 2001 dog 57,25, for 2002 57,28, for 2003 57,19 og for 2004 57,12.

** Gælder for den fossile del (blandet plast) af affaldet.