

drikker hesten typisk 5-10 pct. af sin legemsvægt dagligt. Diegivende hopper, opdræt og heste der sveder har et forholdsmæssigt større vandbehov end øvrige heste.

Hesten foretrækker at drikke fra vandkilder med frit vandspejl frem for at drikke af en vandkop. På stald anvendes oftest vandkopper, som bør give mindst 8 liter vand pr. minut, idet hesten ikke kompenserer for langsomt vandtilløb ved at bruge mere tid på vandindtagelse.

9.1.4. Strukturfoderet skal forsyne hesten med den nødvendige mængde fordøjelige fibre til sikring af en sund mave-tarmfunktion samt tilfredsstillende dens naturlige ædeadfærd. Krybbefoderets primære funktion er at dække de behov, som ikke dækkes af strukturfoderet, dvs. primært energi, protein, mineraler og vitaminer.

Erfaringer og forskning viser, at mange heste ikke får tilstrækkeligt strukturfoder, at mange heste får fordøjelsesrelaterede sygdomme forårsaget af dårlig fodersammensætning, at føl, ungheste og drægtige hopper kan være underforsynet med mineraler, og at mange heste og ponyer får tildelt for meget energi, således at de bliver overvægtige med øget risiko for stofskiftesygdomme, forfængelighed, mavesår mv.

Arbejdsgruppen har fundet, at dyreværnslovens § 2 klart betoner, at hesten skal fodres og vandes under hensyntagen til hestens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Efter arbejdsgruppens opfattelse er der derfor behov for en indsats med henblik på at påvirke og ændre hesteejernes valg af foder til deres heste, således at foderet i højere grad tilgodeser hestenes faktiske behov. På denne baggrund skal der efter arbejdsgruppens opfattelse stilles krav om, at heste skal tildeles tilstrækkeligt strukturfoder.

Arbejdsgruppen har drøftet, om der ud over bestemmelsen i dyreværnslovens § 2 er behov for at fastsætte specifikke krav om hestes adgang til frisk drikkevand. Arbejdsgruppen har i den forbindelse fundet, at heste skal have fri adgang til frisk drikkevand hele døgnet såvel på stald som på fold. Dette gælder dog ikke ved kortere ophold på fold.

Der henvises til kapitel IV, afsnit 6 i arbejdsgruppens rapport.

9.2. Justitsministeriets overvejelser

Efter dyreværnslovens § 2 skal enhver, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de bl.a. fodres og vandes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Det følger således

direkte af dyreværnsloven, at heste skal fodres og vandes i overensstemmelse med deres behov.

Justitsministeriet har noteret sig, at det er arbejdsgruppens erfaring, at mange heste bliver syge eller mistrives som følge af fodring, som skyldes manglende viden om eller fejlagtig fodring samt den korrekte balance mellem strukturfoder og krybbefoder. I den forbindelse har arbejdsgruppen påpeget, at mange heste ikke får dækket deres behov for strukturfoder i tilstrækkeligt omfang.

På denne baggrund kan Justitsministeriet tilslutte sig arbejdsgruppens vurdering, hvorefter det er nødvendigt at stille yderligere krav til fodring af heste med henblik på at sikre, at foderet i tilstrækkeligt omfang tilgodeser hestenes faktiske behov. Der foreslås således i overensstemmelse hermed et krav om, at hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder.

Desuden er Justitsministeriet enig i arbejdsgruppens forslag om, at heste skal have fri adgang til frisk drikkevand såvel på stald, som på fold. Kravet gælder dog ikke ved kortere ophold på fold indtil fire timer.

Der henvises til §§ 21 og 22 i lovforslaget, som med enkelte lovtekniske ændringer svarer til §§ 21 og 22 i arbejdsgruppens lovudkast.

10. Opdræt og særlige forhold vedrørende foling, føl og plage

10.1. Arbejdsgruppens overvejelser

Avl og opdræt af heste finder både hos lægfolk og hos professionelle opdrættere. Typisk er det på en landbrugsejendom, fordi plads og gode græsningsmuligheder er en nødvendighed.

Undersøgelser viser, at mange adfærdsforstyrrelser påbegyndes allerede i fravænningsperioden, samt at fravænningsmetoden har større betydning end føllets alder på tidspunktet for fravænningen. Undersøgelser viser desuden, at føllet stresses mindst, hvis føllet fravænnedes sammen med andre føl gradvist, gerne over en uge eller længere, hvor føllet i starten kan lugte og se hoppen. Det er under alle omstændigheder vigtigt for føllets udvikling, at det også efter fravænningen har adgang til artsfæller.

Efter fravænnelse bør plagen opstaldes i grupper med andre plage, idet plagens sociale færdigheder udvikles ved, at den opholder sig sammen med andre heste det meste af døgnet. Den første vinter kan plagene opstaldes i kønsblandede grupper, men herefter vil det være nødvendigt at kønsopdele plagene for at undgå uønskede drægtigheder. Den anden vinter vil plagene have sværere ved at få grupperne til at fungere, fordi den højest rangerende plage ofte vil udvise aggressiv